
ANEXOS

ANEXO A

***PROTOCOLO DOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA
FUNCIONAL DA BATERIA DE TESTES DE RIKLI & JONES (1999B)***

Protocolo dos Testes de Aptidão Física Funcional da Bateria de Testes de Rikli & Jones (1999b)

1. Levantar e Sentar na Cadeira

Objectivo:

Avaliar a força e resistência dos membros inferiores (número de execuções em 30'' sem a utilização dos membros superiores).

Equipamento:

Cronómetro, cadeira com encosto (sem braços), com altura do assento aproximadamente 43 cm. Por razões de segurança, a cadeira deve ser colocada contra uma parede, ou estabilizada de qualquer outro modo, evitando que se mova durante o teste.

Protocolo:

O teste inicia-se com o participante sentado no meio da cadeira, com as costas direitas e os pés afastados à largura dos ombros e totalmente apoiados no solo. Um dos pés deve estar ligeiramente avançado em relação ao outro para ajudar a manter o equilíbrio. Os membros superiores estão cruzados ao nível dos pulsos e contra o peito. Ao sinal de “partida” o participante eleva-se até à extensão máxima (posição vertical) e regressa à posição inicial sentado. O participante é encorajado a completar o máximo de repetições num intervalo de tempo de 30''. Enquanto controla o desempenho do participante para assegurar o maior rigor, o avaliador conta as elevações correctas. Chamadas de atenção verbais (ou gestuais) podem ser realizadas para corrigir um desempenho deficiente.

Prática/ ensaio:

Após uma demonstração realizada pelo avaliador, um dos dois ensaios podem ser efectuados pelo participante visando uma execução correcta. De imediato segue-se a aplicação do teste.

Pontuação:

A pontuação obtida pelo número total de execuções correctas num intervalo de 30''. Se o participante estiver a meio da elevação no final dos 30'', esta deve contar como uma elevação.

2. Flexão do Antebraço**Objectivo:**

Avaliar a força e resistência do membro superior (número de execuções em 30'')

Equipamento:

Cronómetro, cadeira com encosto (sem braços) e halteres de mão (2,27 Kg para mulheres e 3,36 Kg para homens).

Devido à ausência do haltere com o peso certo utilizou-se um peso aproximado de 2,07 kg para as mulheres e de 3,29 par os homens.

Protocolo:

O participante está sentado numa cadeira, com as costas direitas, com os pés totalmente assentes no solo e com o tronco totalmente encostado. O haltere está seguro na mão dominante. O teste começa com o antebraço em posição inferior, ao lado da cadeira, perpendicular ao solo. Ao sinal de “iniciar” o participante roda gradualmente a palma da mão para cima, enquanto faz a flexão do antebraço no sentido completo do movimento; depois regressa à posição inicial de extensão do antebraço. Especial atenção deverá ser dada ao controlo da fase final da extensão do antebraço.

O avaliador ajoelha-se (ou senta-se numa cadeira) junto do participante no lado do braço dominante, colocando os seus dedos no bicípite do executante, de modo a estabilizar a parte superior do braço, e assegurar que seja realizada uma flexão completa (o antebraço do participante deve apertar os dedos do avaliador). É importante que a parte superior do braço permaneça estática durante o teste.

O avaliador pode precisar de colocar a sua outra mão atrás do cotovelo de maneira a que o executante saiba quando atingiu a extensão total, evitando

movimentos de balanço do antebraço. O relógio deve ser colocado de maneira totalmente visível.

O participante é encorajado a realizar o maior número possível de flexões num tempo limite de 30'', mas sempre com movimentos controlados tanto na fase de flexão como de extensão. O avaliador deverá acompanhar as execuções de forma a assegurar que o peso é transportado em toda a amplitude do movimento – da extensão total à flexão total.

Cada flexão correcta é contabilizada, com chamadas de atenção verbais sempre que se verifique um desempenho incorrecto.

Prática/ ensaio:

Após demonstração por parte do avaliador deverão ser realizadas, uma ou duas tentativas pelo participante para confirmar uma realização correcta, seguindo-se a execução do teste durante 30''.

Pontuação:

A pontuação é obtida pelo número total de flexões correctas realizadas num intervalo de 30''. Se no final dos 30'' o antebraço estiver em meia-flexão, deve contabilizar-se como flexão total.

3. Sentado e Alcançar

Objectivo:

Avaliar a flexibilidade dos membros inferiores (distância atingida na direcção dos dedos dos pés)

Equipamento:

Cadeira com encosto (aproximadamente 43 cm de altura até ao assento) e uma régua de 45 cm. Por razões de segurança, a cadeira deve ser colocada contra uma parede de forma a que se mantenha estável (não deslize para a frente) quando o participante se sentar na respectiva extremidade.

Protocolo:

Começando numa posição sentado, o participante avança o seu corpo para a frente, até se encontrar sentado na extremidade do assento da cadeira. A dobra entre o topo da perna e as nádegas deve estar ao nível da extremidade do assento. Com uma perna flectida e o pé totalmente assente no solo, a outra perna (a perna de preferência) é estendida na direcção da coxa, com o calcanhar no chão e o pé flectido (aprox. 90°). O participante deve ser encorajado a expirar à medida que flecte para a frente, evitando movimentos bruscos, rápidos e fortes, nunca atingindo o limite da dor.

Com a perna estendida (mas não hiper-estendida), o participante flecte lentamente para a frente até à articulação da coxo-femural (a coluna deve manter-se o mais direita possível, coma cabeça no prolongamento da coluna, portanto não flectida), deslizando as mãos (uma sobre a outra, com as pontas dos dedos sobrepostas) ao longo da perna estendida, tentando tocar os dedos dos pés. Deve tocar nos dedos dos pés durante 2''. Se o joelho da perna estendida começar a flectir, solicitar ao participante que se sente lentamente até que o joelho fica na posição estendida antes de iniciar a medição.

Prática/ ensaio:

Após demonstração realizada pelo avaliador, o participante é questionado sobre a sua perna preferencial. O participante deve ensaiar duas vezes, seguindo-se a aplicação do teste.

Pontuação:

Usando uma régua de 45 cm, o avaliador regista a distância (cm) até aos dedos dos pés (resultado mínimo) ou a distância (cm) que consegue alcançar para além dos dedos dos pés (resultado máximo). O meio do dedo grande do pé, na extremidade do sapato, representa o ponto zero. Registar ambos os valores encontrados com a aproximação de 1 cm, e fazer um circulo sobre o melhor resultado. O melhor resultado é usado para avaliar o desempenho. Assegure-se de que regista os sinais – ou + na folha de registo.

Atenção:

O avaliador deve ter em atenção as pessoas que apresentam problemas de equilíbrio, quando sentadas na extremidade da cadeira.

A perna preferida é definida pelo melhor resultado. É importante trabalhar os dois lados do corpo ao nível da flexibilidade, mas por questões de tempo apenas o lado hábil tem sido usado para a definição de padrões.

4. Estatura e Peso:

Objectivo:

Avaliar o índice de massa corporal (kg/m²).

Equipamento:

Balança, fita métrica de 150 cm, régua e marcador.

Calçado:

Por uma questão de tempo, as pessoas podem estar calçadas durante a medição da altura e do peso, com os ajustamentos abaixo descritos.

Protocolo:

Estatura – uma fita métrica deve ser aplicada verticalmente numa parede, com a posição zero exactamente a 50 cm acima do solo. O participante encontra-se de pé encostado à parede (a parte média da cabeça está alinhada com a fita métrica) e olhando em frente. O avaliador coloca a régua (ou objecto similar) sobre a cabeça do participante, mantendo-a nivelada, estendendo-a até à fita métrica. A estatura da pessoa é a medida (cm) indicada na fita métrica, mais 50 cm (distância a partir do solo até ao ponto zero da fita métrica). Caso se o participante se encontre calçado, pode ainda retirar-se de 1,3 cm a 2,5 cm do total dos cm, usando o critério mais rigoroso possível.

Peso – o participante deve despir todas as peças de vestuário pesadas, tais como, casacos, camisolas grossas, etc. O peso é medido e registado com aproximação às 100 g e ajustamentos relativos ao peso do calçado. Em geral deve ser subtraído 0,45 kg para mulheres e 0,91 kg para homens.

5. Sentado, Caminhar 2,44 e Voltar a Sentar

Objectivo:

Avaliar a mobilidade física – velocidade, agilidade e equilíbrio dinâmico.

Equipamento:

Cronómetro, fita métrica, cone (ou outro marcador) e cadeira com encosto (aproximadamente 43 cm de altura).

Montagem:

A cadeira deve ser posicionada contra a parede ou de outra forma que garanta a posição estática durante o teste. A cadeira deve também estar numa zona desobstruída, em frente a um cone à distância de 2,44 m (medição desde a ponta da cadeira até à parte anterior do marcador). Deverá haver pelo menos 1,22 m de distância livre à volta do cone, permitindo ao participante contornar livremente o cone.

Protocolo:

O teste é iniciado com o participante totalmente sentado na cadeira (postura erecta), mãos nas coxas, e pés totalmente assentes no solo (um pé ligeiramente avançado em relação ao outro). Ao sinal de “partida” o participante eleva-se da cadeira, caminha o mais rápido possível à volta do cone (por qualquer dos lados) e regressa à cadeira. O participante deve ser informado de que se trata de um teste “por tempo”, sendo o objectivo caminhar o mais depressa possível (sem correr) à volta do cone e regressar à cadeira. O avaliador deve funcionar como assistente, mantendo-se a meia distância entre a cadeira e o cone, de maneira a poder dar assistência em caso de desequilíbrio. O avaliador deve iniciar o cronómetro ao sinal de “partida” quer a pessoa tenha ou não iniciado o movimento, e pará-lo no momento exacto em que a pessoa se senta.

Prática / ensaio:

Após demonstração, o participante deve experimentar uma vez, realizando duas vezes o exercício. Deve chamar-se a atenção do participante de que o tempo é contabilizado até este estar completamente sentado na cadeira.

Pontuação:

O resultado corresponde ao tempo decorrido entre o sinal de “partida” até ao momento em que o participante está sentado na cadeira. Registam-se os dois valores até ao 0,01'. O melhor resultado é utilizado para medir o desempenho.

6. Alcançar Atrás das Costas

Objectivo:

Avaliar a flexibilidade dos membros superiores (distância que as mãos podem atingir atrás das costas).

Equipamento:

Régua de 45 cm

Protocolo:

Na posição de pé, o participante coloca a mão dominante por cima do mesmo e alcança o mais baixo possível em direcção ao meio das costas, palma da mão para baixo e dedos estendidos (o cotovelo apontado para cima). A mão do outro braço é colocada por baixo e atrás, com a palma virada para cima, tentando alcançar o mais longe possível numa tentativa de tocar (ou sobrepor) os dedos médios de ambas as mãos.

Prática/ ensino:

Após demonstração por parte do avaliador, o participante é questionado sobre a sua mão de preferência. Sem mover as mãos do participante, o avaliador ajuda a orientar os dedos médios de ambas as mãos na direcção um do outro. O participante experimenta duas vezes, seguindo-se duas tentativas do teste. O participante não pode entrelaçar os dedos e puxar.

Pontuação:

A distância de sobreposição, ou a distância entre os médios é medida ao cm mais próximo. Os resultados negativos (-) representam a distância mais curta entre os dedos médios; os resultados positivos (+) representam a medida da sobreposição dos dedos médios. Registam-se duas medidas. O “melhor” valor é usado para medir o desempenho. Certifique-se de que marca os sinais – e + na ficha de pontuação.

7. Andar 6 minutos

Objectivo:

Avaliar a resistência aeróbia percorrendo a maior distância em 6 minutos)

Equipamento:

Cronómetro, fita métrica, cones (ou outro marcador) e giz. As cadeiras devem estar colocadas ao longo de vários pontos, na parte de fora do circuito.

Montagem:

O teste envolve a medição da distância máxima que pode ser caminhada durante seis minutos ao longo de percurso de 50m, sendo marcados segmentos de 5m. Os participantes caminham continuamente em redor do percurso marcado, durante um período de 6 minutos, tentando percorrer a máxima distância possível. A área de percurso deve ser bem iluminada, a superfície não deve ser deslizante e lisa. Se necessário o teste pode ser realizado numa área rectangular marcada me segmentos de 5m.

Protocolo:

Para facilitar o processo de contagem das voltas do percurso, pode ser dado ao participante um pau (ou objecto similar) no fim de cada volta, ou então um colega pode marcar numa ficha de registo sempre que uma volta é terminada. Ao sinal de partida, os participantes são instruídos para caminhar o mais rapidamente possível (sem correrem) na distância marcada à volta dos cones. Se necessário os participantes podem parar e descansar, sentando-se e retomando depois o percurso.

Prática/ensino:

O participante deve experimentar uma ocasião anterior ao dia do teste, para que possa criar o seu ritmo. No dia do teste, o avaliador deve fazer uma demonstração do procedimento e permitir ao participante que pratique rapidamente para assegurar a compreensão do protocolo. Os participantes devem ser encorajados verbalmente no sentido de obterem o desempenho máximo.

Pontuação:

O resultado representa o número total de metros caminhados durante os seis minutos.

Precauções

Qualquer participante deve interromper o teste caso tenha tonturas, dor, náuseas ou fadiga.

ANEXO B

DADOS DA CONDIÇÃO FÍSICA FUNCIONAL

ANEXO 1

Tabela 1.1. – Dados da Condição Física Funcional relativos ao primeiro subgrupo das mulheres.

| Nº | Idade | I.M.C. | Força Inf. | Força Sup. | Flexibilidade Inf. | V.A.E. | Flexibilidade Sup. | Dist. (Res. Aeróbia) |
|----|-------|--------|------------|------------|--------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 1 | 65 | 28.42 | 16 | 18 | -30,5 | 5.09 | -14 | 432 |
| 2 | 65 | 26.67 | 14 | 15 | 6 | 5.4 | -23 | 530 |
| 3 | 65 | 45.51 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 65 | 33.57 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 65 | 33.18 | 22 | 26 | 5 | 4.88 | -1 | 552 |
| 6 | 65 | 23.81 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 65 | 31.91 | 18 | 24 | 3 | 5.09 | -25 | 432 |
| 8 | 65 | 36.84 | 16 | 20 | -7 | 4.92 | -22 | 415 |
| 9 | 65 | 25.51 | 17,0 | 16,0 | 5,0 | 4.79 | -26,0 | 480,0 |
| 10 | 65 | 28.97 | 12 | 14 | -22 | 6.75 | -14 | 455 |
| 11 | 66 | 25.46 | 13,0 | 17,0 | 1,0 | 5.9 | 5.00 | 384,0 |
| 12 | 66 | 34.13 | 13 | 16 | 6 | 5.15 | -12 | 410 |
| 13 | 66 | 32.17 | 10 | 13 | -23 | 7.14 | -30 | 440 |
| 14 | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 68 | 32.99 | 16 | 18 | 11 | 5.59 | -20 | 360 |
| 16 | 68 | 27.28 | 15 | 15 | -12 | 5.82 | -21 | 455 |
| 17 | 68 | 27.24 | 17 | 17 | 3 | 5.57 | -17,5 | 480 |
| 18 | 69 | 41.97 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 70 | 26.85 | 8 | 10 | 4 | 6.3 | 1 | 415 |
| 20 | 71 | 32.85 | 11 | 15 | -28 | 14.37 | -31 | 192 |
| 21 | 72 | 33.05 | 8 | 13 | -14 | 8.11 | -17 | 438 |
| 22 | 72 | 27.84 | 12 | 15 | 9 | 6 | -8 | 432 |
| 23 | 73 | 28.37 | 15 | 18 | 35 | 6.18 | -8 | 420 |
| 24 | 73 | 29.89 | 13 | 14 | 3 | 6.29 | -14 | 455 |
| 25 | 73 | 36.46 | 11 | 14 | -1 | 7.56 | -26 | 410 |

Tabela 1.2. – Dados da Condição Física Funcional relativos ao segundo subgrupo das mulheres.

| Nº | Idade | I.M.C. | Força Inf. | Força Sup. | Flexibilidade Inf. | V.A.E. | Flexibilidade Sup. | Dist. (Res. Aeróbia) |
|----|-------|--------|------------|------------|--------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 26 | 75 | 26.37 | 11,0 | 13,0 | 8,0 | 7.38 | -8,0 | 11,0 |
| 27 | 75 | 31.27 | 16 | 16 | -1 | 6.1 | -15 | 16 |
| 28 | 76 | 33.51 | 15 | 13 | -2 | 5.97 | -17 | 15 |
| 29 | 78 | 29.07 | 11,0 | 16,0 | -26,0 | 7.00 | -11,0 | 11,0 |
| 30 | 78 | 33.2 | 12 | 17 | -14 | 7.22 | -19 | 12 |
| 31 | 78 | 32.42 | 13 | 12 | 2 | 7.03 | -17 | 13 |
| 32 | 78 | 27.38 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 78 | 29.78 | 13 | 11 | -26 | 9.17 | -19 | 13 |
| 34 | 78 | 31.12 | 15 | 20 | 4 | 6.62 | -5 | 15 |
| 35 | 79 | 33.8 | 11,0 | 14,0 | -26,0 | 7.44 | -25,0 | 11,0 |
| 36 | 79 | 30.56 | 12,0 | 19,0 | -11,0 | 7.22 | -16,0 | 12,0 |
| 37 | 79 | 26.41 | 12 | 16 | 0 | 7.8 | -22 | 12 |
| 38 | 79 | 30.73 | 22 | 21 | 8 | 7.31 | -19 | 22 |
| 39 | 79 | 40.42 | 17 | 17 | 0 | 9.69 | -31 | 17 |
| 40 | 80 | 35.14 | 8 | 11 | 5 | 8.22 | -26 | 8 |
| 41 | 80 | 27.83 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 80 | 29.23 | 15 | 15 | -2 | 6.34 | -6 | 15 |
| 43 | 80 | 33.48 | 7 | 7 | -16 | 14.92 | -24 | 7 |
| 44 | 80 | 29.97 | 12 | 12 | -4 | 7.6 | -5 | 12 |
| 45 | 81 | 30.98 | 11,0 | 17,0 | 1,0 | 6.12 | -21,0 | 11,0 |
| 46 | 81 | 25.62 | 12 | 15 | -15 | 10.45 | -13 | 12 |
| 47 | 81 | 34.91 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 81 | 34.31 | 6 | 12 | -22 | 20.34 | -29 | 6 |
| 49 | 82 | 31.51 | 8 | 13 | -6 | 10.41 | -38 | 8 |
| 50 | 82 | 26.92 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 2 | 30.44 | 6 | 12 | -23 | 12.33 | -14 | 6 |
| 52 | 0 | 30.07 | 11 | 10 | -19 | 6.78 | -41 | 11 |
| 53 | - | 29.54 | 11 | 11 | -18,5 | 11.13 | -37 | 11 |
| 54 | - | 28.31 | 13 | 18 | -31 | 7.75 | -34 | 13 |
| 54 | - | 32.54 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | 38.92 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | 26.37 | - | - | - | - | - | - |

Tabela 1.3. – Dados da Condição Física Funcional relativos ao terceiro subgrupo das mulheres.

| Nº | Idade | I.M.C. | Força Inf. | Força Sup. | Flexibilidade Inf. | V.A.E. | Flexibilidade Sup. | Dist. (Res. Aeróbia) |
|----|-------|--------|------------|------------|--------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 57 | 85 | 21.14 | 15 | 17 | 0 | 6.38 | -13 | 448 |
| 58 | 85 | 25.22 | 10 | 13 | 1 | 8.69 | -16 | 325 |
| 59 | 86 | 24.43 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 8,00 | -11,0 | 400,0 |
| 60 | 86 | 21.9 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 86 | 29.53 | 13,0 | 14,0 | 2,0 | 9.81 | -15,0 | 252,0 |
| 62 | 86 | 29.46 | 8 | 14 | 0 | 16.75 | -18 | 236 |
| 63 | 87 | 28.38 | 8 | 12 | 0 | 8.65 | -8 | 336 |
| 64 | 88 | 23.71 | 10 | 14 | -14 | 11.59 | -27 | 232 |
| 65 | 88 | 27.49 | 5 | 7 | -2,9 | 16.61 | -28 | 252 |
| 66 | 88 | 35.61 | 11 | 13 | 0 | 15.76 | -35 | 145 |
| 67 | 91 | 30.8 | 9 | 14 | 3 | 14.78 | -26 | 215 |
| 68 | 92 | 24.11 | 5 | 8 | -4 | 10.09 | -26 | 180 |
| 69 | 92 | 22.77 | 8 | 7 | 0 | 12.17 | -23 | 264 |
| 70 | 95 | 28.1 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 8.37 | -25,0 | 264,0 |

Tabela 1.4. – Dados da Condição Física Funcional relativos ao primeiro subgrupo dos homens.

| Nº | Idade | I.M.C. | Força Inf. | Força Sup. | Flexibilidade Inf. | V.A.E. | Flexibilidade Sup. | Dist. (Res. Aeróbia) |
|----|-------|--------|------------|------------|--------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 1 | 65 | 26.4 | 15 | 16 | -11.5 | 6.03 | -20 | 400 |
| 2 | 65 | 21.5 | 10 | 12 | -4 | 15.28 | -32 | 275 |
| 3 | 66 | 28.4 | 12 | 13 | -19 | 11.2 | -70 | 265 |
| 4 | 66 | 22.8 | 14 | 15 | -1 | 4.97 | -7 | 575 |
| 5 | 66 | 21.9 | 21 | 21 | -20 | 4.57 | -35 | 486 |
| 6 | 67 | 26,0 | 21 | 26 | -8 | 4.52 | 0 | 590 |
| 7 | 67 | 29.3 | 11 | 15 | 0 | 6.09 | -31 | 505 |
| 8 | 67 | 29,0 | 20 | 21 | -15 | 5.4 | -26 | 515 |
| 9 | 68 | 32.9 | 12 | 17 | -28 | 9.76 | -38 | 256 |
| 10 | 68 | 25.7 | 12 | 15 | -32 | 5.31 | -35 | 550 |
| 11 | 68 | 29.5 | 14 | 18 | 3 | 5.84 | -28 | 465 |
| 12 | 68 | 26.3 | 12 | 13 | -6 | 6.15 | -15 | 480 |
| 13 | 72 | 29.7 | 16 | 19 | -15 | 10.66 | -43 | 240 |
| 14 | 72 | 30.7 | 13 | 15 | -26 | 8.24 | -30 | 424 |
| 15 | 72 | 25.1 | 12 | 17 | -13 | 6.06 | -42 | 424 |
| 16 | 73 | 40.5 | 8,0 | 8,0 | -4,0 | 8.44 | -53,0 | 288,0 |
| 17 | 73 | 29.5 | 17 | 16 | -22 | 6.06 | -17 | 505 |
| 18 | 74 | 30,0 | 14 | 17 | 0 | 5.03 | -32 | 432 |

Tabela 1.5. – Dados da Condição Física Funcional relativos ao segundo subgrupo dos homens.

| Nº | Idade | I.M.C. | Força Inf. | Força Sup. | Flexibilidade Inf. | V.A.E. | Flexibilidade Sup. | Dist. (Res. Aeróbia) |
|----|-------|--------|------------|------------|--------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 19 | 75 | 30.7 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 75 | 27.2 | 13 | 13 | -7 | 7.22 | -27 | 480 |
| 21 | 75 | 28.6 | 16 | 13 | -44 | 4.98 | -35 | 415 |
| 22 | 76 | 28.1 | 12,0 | 17,0 | -41,0 | 5.69 | -32,0 | 516,0 |
| 23 | 76 | 24.2 | 19 | 24 | -17 | 5.13 | -2 | 528 |
| 24 | 77 | 31.4 | 11 | 19 | -30 | 7.43 | -28 | 408 |
| 25 | 77 | 27.7 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 78 | 27.6 | 14,0 | 13,0 | -11,0 | 6.5 | -11,0 | 424,0 |
| 27 | 78 | 25.3 | 15,0 | 15,0 | -30,0 | 5.25 | -25,0 | 492,0 |
| 28 | 78 | 33,0 | 12 | 13 | 6 | 9.34 | -35 | 290 |
| 29 | 78 | 25.9 | 13 | 13 | 0 | 5.62 | -20 | 495 |
| 30 | 79 | 26.3 | 7 | 13 | -21 | 12.77 | -24 | 252 |
| 31 | 80 | 28.5 | 16,0 | 21,0 | -26,0 | 6,00 | -27,0 | 444,0 |
| 32 | 80 | 27,0 | 11 | 12 | -19 | 7.81 | -56 | 410 |
| 33 | 81 | 27.1 | 14,0 | 15,0 | -25,0 | 6.37 | -29,0 | 424,0 |
| 34 | 81 | 33.2 | 14 | 16 | -2 | 6.01 | -25 | 492 |
| 35 | 81 | 30.5 | 0 | 13 | -51 | | -44 | 215 |
| 36 | 81 | 28.4 | 9 | 13 | -37 | 13.34 | -19 | 305 |
| 37 | 81 | 36.1 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 82 | 32.9 | 18,0 | 15,0 | -15,0 | 8.02 | -34,0 | 396,0 |
| 39 | 82 | 26.1 | 12 | 15 | -25.5 | 6.21 | -7.5 | 440 |
| 40 | 83 | 28.3 | 11 | 15 | -13 | 8.21 | -28 | 430 |

Tabela 1.6. – Dados do POMS relativos ao terceiro subgrupo dos homens.

| Nº | Idade | I.M.C. | Força Inf. | Força Sup. | Flexibilidade Inf. | V.A.E. | Flexibilidade Sup. | Dist. (Res. Aeróbia) |
|----|-------|--------|------------|------------|--------------------|--------|--------------------|----------------------|
| 41 | 86 | 29.8 | 7 | 14 | -32 | 16.28 | -37 | 246 |
| 42 | 86 | 27.0 | 7 | 11 | -25 | 18.13 | -23.5 | 252 |
| 43 | 87 | 24.9 | 8 | 7 | -30 | 21.25 | -50 | 204 |
| 44 | 89 | 32.0 | - | - | - | - | - | - |

ANEXO C

INQUÉRITO POMS-SF

ANEXO D

DADOS DO POMS-SF

ANEXO 2

Tabela 2.1. – Dados do POMS relativos ao primeiro subgrupo das mulheres.

| Nº | Idade | Depressão | Tensão | Fadiga | Vigor | Irritação | Confusão |
|----|-------|-----------|--------|--------|-------|-----------|----------|
| 1 | 65 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 65 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | 65 | 3 | 10 | 13 | 11 | 2 | 4 |
| 4 | 65 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| 5 | 65 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 65 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 65 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 8 | 65 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | 65 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 65 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 66 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| 13 | 66 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 67 | 13 | 9 | 10 | 4 | 8 | 5 |
| 15 | 68 | 11 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 |
| 16 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 68 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | 69 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 |
| 19 | 70 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 20 | 71 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 21 | 72 | 1 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 |
| 22 | 72 | 9 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 |
| 23 | 73 | 14 | 5 | 6 | 16 | 2 | 4 |
| 24 | 73 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | 73 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |

Tabela 2.2. – Dados do POMS relativos ao segundo subgrupo das mulheres.

| Nº | Idade | Depressão | Tensão | Fadiga | Vigor | Irritação | Confusão |
|----|-------|-----------|--------|--------|-------|-----------|----------|
| 26 | 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | 75 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 |
| 28 | 76 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 29 | 78 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 30 | 78 | 13 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 |
| 31 | 78 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | 78 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | 78 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 34 | 78 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| 35 | 79 | 5 | 9 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 36 | 79 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 37 | 79 | 5 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 |
| 38 | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 79 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 8 |
| 40 | 80 | 14 | 12 | 16 | 5 | 3 | 1 |
| 41 | 80 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 42 | 80 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | 1 |
| 43 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 81 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 46 | 81 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 47 | 81 | 5 | 9 | 6 | 9 | 0 | 6 |
| 48 | 81 | 13 | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| 49 | 82 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| 52 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | - | - | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |

Tabela 2.3. – Dados do POMS relativos ao terceiro subgrupo das mulheres.

| Nº | Idade | Depressão | Tensão | Fadiga | Vigor | Irritação | Confusão |
|----|-------|-----------|--------|--------|-------|-----------|----------|
| 57 | 85 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | 85 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 59 | 86 | 6 | 6 | 7 | 10 | 0 | 1 |
| 60 | 86 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 61 | 86 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 62 | 86 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 63 | 87 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 64 | 88 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 65 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 88 | 12 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 |
| 67 | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 92 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 69 | 92 | - | - | - | - | - | - |
| 70 | 95 | 0 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 |

Tabela 2.4. – Dados do POMS relativos ao primeiro subgrupo dos homens.

| Nº | Idade | Depressão | Tensão | Fadiga | Vigor | Irritação | Confusão |
|----|-------|-----------|--------|--------|-------|-----------|----------|
| 1 | 65 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 65 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | 66 | 17 | 9 | 12 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 66 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| 6 | 67 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 7 | 67 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 8 | 67 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 68 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 11 | 68 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | 68 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 72 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 14 | 72 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | 72 | 13 | 9 | 10 | 10 | 3 | 6 |
| 16 | 73 | 5 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 |
| 17 | 73 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | 74 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 |

Tabela 2.5. – Dados do POMS relativos ao segundo subgrupo dos homens.

| Nº | Idade | Depressão | Tensão | Fadiga | Vigor | Irritação | Confusão |
|----|-------|-----------|--------|--------|-------|-----------|----------|
| 19 | 75 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 20 | 75 | 2 | 8 | 4 | 11 | 2 | 0 |
| 21 | 75 | 4 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 22 | 76 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | 76 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 77 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| 25 | 77 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 4 |
| 26 | 78 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | 78 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 28 | 78 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 29 | 78 | 0 | 3 | 4 | 12 | 1 | 3 |
| 30 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 80 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 32 | 80 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 |
| 33 | 81 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 81 | 12 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 35 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 36 | 81 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | 81 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 82 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 |
| 39 | 82 | 5 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 40 | 83 | 16 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 |

Tabela 2.6. – Dados do POMS relativos ao terceiro subgrupo dos homens.

| Nº | Idade | Depressão | Tensão | Fadiga | Vigor | Irritação | Confusão |
|-----------|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| 41 | 86 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 42 | 86 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 87 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | 89 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |

ANEXO E

DADOS DO TRATAMENTO ESTATÍSTICO

ANEXO 3

Tabela 3.1 - Média e desvio padrão das variáveis da Condição Física Funcional, nos escalões etários das mulheres.

Descriptives

| | | N | Mean | Std. Deviation | Minimum | Maximum |
|---------|-------|----------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| IMC | 1,00 | 24 | 31,2958 | 5,2506 | 23,80 | 45,50 |
| | 2,00 | 31 | 31,1484 | 3,4374 | 25,60 | 40,40 |
| | 3,00 | 14 | 26,6143 | 4,0192 | 21,10 | 35,60 |
| | Total | 69 | 30,2797 | 4,5935 | 21,10 | 45,50 |
| FO.INF | 1,00 | 20 | 13,8500 | 3,4683 | 8,00 | 22,00 |
| | 2,00 | 26 | 11,8846 | 3,5477 | 6,00 | 22,00 |
| | 3,00 | 13 | 9,8462 | 3,1317 | 5,00 | 15,00 |
| | Total | 59 | 12,1017 | 3,6892 | 5,00 | 22,00 |
| FO.SUP | 1,00 | 20 | 16,4000 | 3,7049 | 10,00 | 26,00 |
| | 2,00 | 26 | 14,2692 | 3,3294 | 7,00 | 21,00 |
| | 3,00 | 13 | 12,1538 | 3,0780 | 7,00 | 17,00 |
| | Total | 59 | 14,5254 | 3,7063 | 7,00 | 26,00 |
| FL.INF | 1,00 | 20 | -2,3250 | 15,5633 | -30,50 | 35,00 |
| | 2,00 | 26 | -10,0577 | 12,3890 | -31,00 | 8,00 |
| | 3,00 | 13 | -,4538 | 5,1050 | -14,00 | 9,00 |
| | Total | 59 | -5,3203 | 13,0138 | -31,00 | 35,00 |
| V.A.E | 1,00 | 20 | 6,3450 | 2,0982 | 4,79 | 14,37 |
| | 2,00 | 26 | 8,9215 | 3,3245 | 5,97 | 20,34 |
| | 3,00 | 13 | 11,3577 | 3,5578 | 6,38 | 16,75 |
| | Total | 59 | 8,5849 | 3,5113 | 4,79 | 20,34 |
| FL.SUP | 1,00 | 20 | -16,1750 | 10,1090 | -31,00 | 5,00 |
| | 2,00 | 26 | -21,3846 | 11,0962 | -44,00 | -5,00 |
| | 3,00 | 13 | -20,8462 | 7,9251 | -35,00 | -8,00 |
| | Total | 59 | -19,5000 | 10,2642 | -44,00 | 5,00 |
| DIST | 1,00 | 20 | 429,3500 | 71,4278 | 192,00 | 552,00 |
| | 2,00 | 26 | 347,0769 | 74,9341 | 180,00 | 468,00 |
| | 3,00 | 13 | 273,0000 | 84,6158 | 145,00 | 448,00 |
| | Total | 59 | 358,6441 | 94,8730 | 145,00 | 552,00 |
| FC.6MIN | 1,00 | 20 | 122,6500 | 18,1899 | 95,00 | 154,00 |
| | 2,00 | 23 | 111,5217 | 23,1278 | 82,00 | 168,00 |
| | 3,00 | 11 | 108,3636 | 18,9698 | 82,00 | 144,00 |
| | Total | 54 | 115,0000 | 21,0955 | 82,00 | 168,00 |

Tabela 3.2 - Média e desvio padrão das variáveis das Dimensões Psicológicas do POMS, nos escalões etários das mulheres.

Descriptives

| | | N | Mean | Std. Deviation | Minimum | Maximum |
|-----------|-------|----------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| DEPRESSÃO | 1,00 | 22 | 4,4545 | 4,3723 | ,00 | 14,00 |
| | 2,00 | 24 | 4,8750 | 4,5618 | ,00 | 14,00 |
| | 3,00 | 10 | 3,4000 | 3,9215 | ,00 | 12,00 |
| | Total | 56 | 4,4464 | 4,3356 | ,00 | 14,00 |
| TENSÃO | 1,00 | 22 | 4,4091 | 3,2464 | ,00 | 10,00 |
| | 2,00 | 24 | 4,7917 | 3,9229 | ,00 | 12,00 |
| | 3,00 | 10 | 4,2000 | 2,6162 | 1,00 | 10,00 |
| | Total | 56 | 4,5357 | 3,4110 | ,00 | 12,00 |
| FADIGA | 1,00 | 22 | 4,9545 | 4,0530 | ,00 | 13,00 |
| | 2,00 | 24 | 5,3750 | 4,2305 | ,00 | 16,00 |
| | 3,00 | 10 | 4,5000 | 4,3525 | ,00 | 13,00 |
| | Total | 56 | 5,0536 | 4,1183 | ,00 | 16,00 |
| VIGOR | 1,00 | 22 | 7,9545 | 3,9578 | 3,00 | 16,00 |
| | 2,00 | 24 | 6,7083 | 3,4450 | ,00 | 12,00 |
| | 3,00 | 10 | 6,9000 | 2,9981 | 1,00 | 10,00 |
| | Total | 56 | 7,2321 | 3,5726 | ,00 | 16,00 |
| IRRITAÇÃO | 1,00 | 22 | 1,7273 | 2,1198 | ,00 | 8,00 |
| | 2,00 | 24 | ,7083 | 1,0826 | ,00 | 3,00 |
| | 3,00 | 10 | ,7000 | ,9487 | ,00 | 3,00 |
| | Total | 56 | 1,1071 | 1,6145 | ,00 | 8,00 |
| CONFUSÃO | 1,00 | 22 | 1,8636 | 1,8334 | ,00 | 6,00 |
| | 2,00 | 24 | 1,7500 | 2,6085 | ,00 | 8,00 |
| | 3,00 | 10 | ,6000 | ,6992 | ,00 | 2,00 |
| | Total | 56 | 1,5893 | 2,1043 | ,00 | 8,00 |

Tabela 3.3 - Média e desvio padrão das variáveis da Condição Física Funcional, nos escalões etários dos homens.

Descriptives

| | | N | Mean | Std. Deviation | Minimum | Maximum |
|---------|-------|----------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| IMC | 1,00 | 18 | 28,0667 | 4,4149 | 21,50 | 40,50 |
| | 2,00 | 22 | 28,8227 | 2,9927 | 24,20 | 36,10 |
| | 3,00 | 4 | 28,4250 | 3,1160 | 24,90 | 32,00 |
| | Total | 44 | 28,4773 | 3,5902 | 21,50 | 40,50 |
| FO.INF | 1,00 | 18 | 14,1111 | 3,6765 | 8,00 | 21,00 |
| | 2,00 | 19 | 12,4737 | 4,1948 | ,00 | 19,00 |
| | 3,00 | 3 | 7,3333 | ,5774 | 7,00 | 8,00 |
| | Total | 40 | 12,8250 | 4,1441 | ,00 | 21,00 |
| FO.SUP | 1,00 | 18 | 16,3333 | 3,9556 | 8,00 | 26,00 |
| | 2,00 | 19 | 15,1579 | 3,1493 | 12,00 | 24,00 |
| | 3,00 | 3 | 10,6667 | 3,5119 | 7,00 | 14,00 |
| | Total | 40 | 15,3500 | 3,7659 | 7,00 | 26,00 |
| FL.INF | 1,00 | 18 | -12,3056 | 10,5623 | -32,00 | 3,00 |
| | 2,00 | 19 | -21,5000 | 15,3668 | -51,00 | 6,00 |
| | 3,00 | 3 | -29,0000 | 3,6056 | -32,00 | -25,00 |
| | Total | 40 | -17,9250 | 13,7303 | -51,00 | 6,00 |
| V.A.E | 1,00 | 18 | 7,2006 | 2,8818 | 4,52 | 15,28 |
| | 2,00 | 18 | 7,3278 | 2,4002 | 4,98 | 13,34 |
| | 3,00 | 3 | 18,5533 | 2,5119 | 16,28 | 21,25 |
| | Total | 39 | 8,1326 | 3,9895 | 4,52 | 21,25 |
| FL.SUP | 1,00 | 18 | -30,7778 | 16,2646 | -70,00 | ,00 |
| | 2,00 | 19 | -26,7632 | 12,3112 | -56,00 | -2,00 |
| | 3,00 | 3 | -36,8333 | 13,2508 | -50,00 | -23,50 |
| | Total | 40 | -29,3250 | 14,2400 | -70,00 | ,00 |
| DIST | 1,00 | 18 | 426,3889 | 115,0172 | 240,00 | 590,00 |
| | 2,00 | 19 | 413,4737 | 88,8165 | 215,00 | 528,00 |
| | 3,00 | 3 | 234,0000 | 26,1534 | 204,00 | 252,00 |
| | Total | 40 | 405,8250 | 109,2569 | 204,00 | 590,00 |
| FC.6MIN | 1,00 | 15 | 115,6000 | 17,3609 | 90,00 | 142,00 |
| | 2,00 | 16 | 126,6875 | 22,3658 | 91,00 | 172,00 |
| | 3,00 | 3 | 93,6667 | 17,6730 | 82,00 | 114,00 |
| | Total | 34 | 118,8824 | 21,5965 | 82,00 | 172,00 |

Tabela 3.4 - Média e desvio padrão das variáveis das Dimensões Psicológicas do POMS, nos escalões etários dos homens.

Descriptives

| | | N | Mean | Std. Deviation | Minimum | Maximum |
|-----------|-------|----------|-------------|-----------------------|----------------|----------------|
| DEPRESSÃO | 1,00 | 17 | 4,0000 | 4,7037 | ,00 | 17,00 |
| | 2,00 | 19 | 4,2632 | 4,0530 | ,00 | 16,00 |
| | 3,00 | 2 | 2,5000 | 3,5355 | ,00 | 5,00 |
| | Total | 38 | 4,0526 | 4,2487 | ,00 | 17,00 |
| TENSÃO | 1,00 | 17 | 3,2941 | 2,5190 | ,00 | 9,00 |
| | 2,00 | 19 | 3,5263 | 3,2722 | ,00 | 10,00 |
| | 3,00 | 2 | 1,5000 | ,7071 | 1,00 | 2,00 |
| | Total | 38 | 3,3158 | 2,8579 | ,00 | 10,00 |
| FADIGA | 1,00 | 17 | 2,9412 | 3,4364 | ,00 | 12,00 |
| | 2,00 | 19 | 3,7895 | 2,9922 | ,00 | 11,00 |
| | 3,00 | 2 | 2,5000 | ,7071 | 2,00 | 3,00 |
| | Total | 38 | 3,3421 | 3,1130 | ,00 | 12,00 |
| VIGOR | 1,00 | 17 | 7,9412 | 4,5617 | ,00 | 16,00 |
| | 2,00 | 19 | 6,5263 | 3,2209 | ,00 | 12,00 |
| | 3,00 | 2 | 4,0000 | 1,4142 | 3,00 | 5,00 |
| | Total | 38 | 7,0263 | 3,8868 | ,00 | 16,00 |
| IRRITAÇÃO | 1,00 | 17 | 1,0588 | 1,4349 | ,00 | 5,00 |
| | 2,00 | 19 | 1,1579 | 1,6419 | ,00 | 6,00 |
| | 3,00 | 2 | ,0000 | ,0000 | ,00 | ,00 |
| | Total | 38 | 1,0526 | 1,5058 | ,00 | 6,00 |
| CONFUSÃO | 1,00 | 17 | 1,1176 | 1,9327 | ,00 | 6,00 |
| | 2,00 | 19 | 1,3158 | 1,5294 | ,00 | 4,00 |
| | 3,00 | 2 | ,0000 | ,0000 | ,00 | ,00 |
| | Total | 38 | 1,1579 | 1,6850 | ,00 | 6,00 |

ANEXO 4

Tabela 4.1. Comparação das variáveis da Condição Física Funcional e das Dimensões Psicológicas do POMS, entre escalões etários nas mulheres.

| ANOVA | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----|-------------|--------|------|
| | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| IMC | Between Groups | 236,267 | 2 | 118,134 | 6,505 | ,003 |
| | Within Groups | 1198,564 | 66 | 18,160 | | |
| | Total | 1434,832 | 68 | | | |
| FO.INF | Between Groups | 128,494 | 2 | 64,247 | 5,444 | ,007 |
| | Within Groups | 660,896 | 56 | 11,802 | | |
| | Total | 789,390 | 58 | | | |
| FO.SUP | Between Groups | 145,104 | 2 | 72,552 | 6,235 | ,004 |
| | Within Groups | 651,608 | 56 | 11,636 | | |
| | Total | 796,712 | 58 | | | |
| FL.INF | Between Groups | 1070,822 | 2 | 535,411 | 3,426 | ,039 |
| | Within Groups | 8752,033 | 56 | 156,286 | | |
| | Total | 9822,856 | 58 | | | |
| V.A.E | Between Groups | 203,238 | 2 | 101,619 | 11,118 | ,000 |
| | Within Groups | 511,852 | 56 | 9,140 | | |
| | Total | 715,091 | 58 | | | |
| FL.SUP | Between Groups | 337,016 | 2 | 168,508 | 1,634 | ,204 |
| | Within Groups | 5773,484 | 56 | 103,098 | | |
| | Total | 6110,500 | 58 | | | |
| DIST | Between Groups | 198819,129 | 2 | 99409,565 | 17,223 | ,000 |
| | Within Groups | 323232,396 | 56 | 5772,007 | | |
| | Total | 522051,525 | 58 | | | |
| FC.6MIN | Between Groups | 1933,165 | 2 | 966,583 | 2,277 | ,113 |
| | Within Groups | 21652,835 | 51 | 424,565 | | |
| | Total | 23586,000 | 53 | | | |
| DEPRESSÃO | Between Groups | 15,360 | 2 | 7,680 | ,400 | ,673 |
| | Within Groups | 1018,480 | 53 | 19,217 | | |
| | Total | 1033,839 | 55 | | | |
| TENSÃO | Between Groups | 3,052 | 2 | 1,526 | ,127 | ,881 |
| | Within Groups | 636,877 | 53 | 12,017 | | |
| | Total | 639,929 | 55 | | | |
| FADIGA | Between Groups | 5,760 | 2 | 2,880 | ,165 | ,849 |
| | Within Groups | 927,080 | 53 | 17,492 | | |
| | Total | 932,839 | 55 | | | |
| VIGOR | Between Groups | 19,169 | 2 | 9,585 | ,744 | ,480 |
| | Within Groups | 682,813 | 53 | 12,883 | | |
| | Total | 701,982 | 55 | | | |
| IRRITAÇÃO | Between Groups | 13,935 | 2 | 6,968 | 2,853 | ,067 |
| | Within Groups | 129,422 | 53 | 2,442 | | |
| | Total | 143,357 | 55 | | | |
| CONFUSÃO | Between Groups | 12,063 | 2 | 6,031 | 1,381 | ,260 |
| | Within Groups | 231,491 | 53 | 4,368 | | |
| | Total | 243,554 | 55 | | | |

Tabela 4.2. Comparação das variáveis da Condição Física Funcional, entre escalões etários nas mulheres.

**Multiple Comparisons
Post Hoc Tests**

Scheffe

| Dependent Variable | (I) E.ETÁRIO | (J) E.ETÁRIO | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|------|
| IMC | 1,00 | 2,00 | ,1474 | 1,1587 | ,992 |
| | | 3,00 | 4,6815(*) | 1,4331 | ,007 |
| | 2,00 | 1,00 | -,1474 | 1,1587 | ,992 |
| | | 3,00 | 4,5341(*) | 1,3722 | ,006 |
| | 3,00 | 1,00 | -4,6815(*) | 1,4331 | ,007 |
| | | 2,00 | -4,5341(*) | 1,3722 | ,006 |
| FO.INF | 1,00 | 2,00 | 1,9654 | 1,0218 | ,167 |
| | | 3,00 | 4,0038(*) | 1,2239 | ,007 |
| | 2,00 | 1,00 | -1,9654 | 1,0218 | ,167 |
| | | 3,00 | 2,0385 | 1,1669 | ,226 |
| | 3,00 | 1,00 | -4,0038(*) | 1,2239 | ,007 |
| | | 2,00 | -2,0385 | 1,1669 | ,226 |
| FO.SUP | 1,00 | 2,00 | 2,1308 | 1,0146 | ,120 |
| | | 3,00 | 4,2462(*) | 1,2153 | ,004 |
| | 2,00 | 1,00 | -2,1308 | 1,0146 | ,120 |
| | | 3,00 | 2,1154 | 1,1587 | ,198 |
| | 3,00 | 1,00 | -4,2462(*) | 1,2153 | ,004 |
| | | 2,00 | -2,1154 | 1,1587 | ,198 |
| FL.INF | 1,00 | 2,00 | 7,7327 | 3,7182 | ,125 |
| | | 3,00 | -1,8712 | 4,4538 | ,916 |
| | 2,00 | 1,00 | -7,7327 | 3,7182 | ,125 |
| | | 3,00 | -9,6038 | 4,2465 | ,087 |
| | 3,00 | 1,00 | 1,8712 | 4,4538 | ,916 |
| | | 2,00 | 9,6038 | 4,2465 | ,087 |
| V.A.E | 1,00 | 2,00 | -2,5765(*) | ,8992 | ,022 |
| | | 3,00 | -5,0127(*) | 1,0771 | ,000 |
| | 2,00 | 1,00 | 2,5765(*) | ,8992 | ,022 |
| | | 3,00 | -2,4362 | 1,0270 | ,068 |
| | 3,00 | 1,00 | 5,0127(*) | 1,0771 | ,000 |
| | | 2,00 | 2,4362 | 1,0270 | ,068 |
| FL.SUP | 1,00 | 2,00 | 5,2096 | 3,0200 | ,235 |
| | | 3,00 | 4,6712 | 3,6174 | ,440 |
| | 2,00 | 1,00 | -5,2096 | 3,0200 | ,235 |
| | | 3,00 | -,5385 | 3,4490 | ,988 |
| | 3,00 | 1,00 | -4,6712 | 3,6174 | ,440 |
| | | 2,00 | ,5385 | 3,4490 | ,988 |
| DIST | 1,00 | 2,00 | 82,2731(*) | 22,5965 | ,003 |
| | | 3,00 | 156,3500(*) | 27,0666 | ,000 |
| | 2,00 | 1,00 | -82,2731(*) | 22,5965 | ,003 |
| | | 3,00 | 74,0769(*) | 25,8070 | ,021 |
| | 3,00 | 1,00 | -156,3500(*) | 27,0666 | ,000 |
| | | 2,00 | -74,0769(*) | 25,8070 | ,021 |
| FC.6MIN | 1,00 | 2,00 | 11,1283 | 6,2998 | ,220 |
| | | 3,00 | 14,2864 | 7,7347 | ,192 |
| | 2,00 | 1,00 | -11,1283 | 6,2998 | ,220 |
| | | 3,00 | 3,1581 | 7,5536 | ,916 |
| | 3,00 | 1,00 | -14,2864 | 7,7347 | ,192 |
| | | 2,00 | -3,1581 | 7,5536 | ,916 |

* The mean difference is significant at the .05 level.

Tabela 4.3. Comparação das variáveis das Dimensões Psicológicas do POMS, entre escalões etários nas mulheres.

Multiple Comparisons Post Hoc Tests

Scheffe

| Dependent Variable | (I) E.ETÁRIO | (J) E.ETÁRIO | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|-------|
| DEPRESSÃO | 1,00 | 2,00 | -,4205 | 1,2939 | ,949 |
| | | 3,00 | 1,0545 | 1,6719 | ,820 |
| | 2,00 | 1,00 | ,4205 | 1,2939 | ,949 |
| | | 3,00 | 1,4750 | 1,6500 | ,673 |
| | 3,00 | 1,00 | -1,0545 | 1,6719 | ,820 |
| | | 2,00 | -1,4750 | 1,6500 | ,673 |
| TENSÃO | 1,00 | 2,00 | -,3826 | 1,0232 | ,933 |
| | | 3,00 | ,2091 | 1,3221 | ,988 |
| | 2,00 | 1,00 | ,3826 | 1,0232 | ,933 |
| | | 3,00 | ,5917 | 1,3047 | ,902 |
| | 3,00 | 1,00 | -,2091 | 1,3221 | ,988 |
| | | 2,00 | -,5917 | 1,3047 | ,902 |
| FADIGA | 1,00 | 2,00 | -,4205 | 1,2345 | ,944 |
| | | 3,00 | ,4545 | 1,5951 | ,960 |
| | 2,00 | 1,00 | ,4205 | 1,2345 | ,944 |
| | | 3,00 | ,8750 | 1,5742 | ,857 |
| | 3,00 | 1,00 | -,4545 | 1,5951 | ,960 |
| | | 2,00 | -,8750 | 1,5742 | ,857 |
| VIGOR | 1,00 | 2,00 | 1,2462 | 1,0594 | ,505 |
| | | 3,00 | 1,0545 | 1,3689 | ,744 |
| | 2,00 | 1,00 | -1,2462 | 1,0594 | ,505 |
| | | 3,00 | -,1917 | 1,3510 | ,990 |
| | 3,00 | 1,00 | -1,0545 | 1,3689 | ,744 |
| | | 2,00 | ,1917 | 1,3510 | ,990 |
| IRRITAÇÃO | 1,00 | 2,00 | 1,0189 | ,4612 | ,097 |
| | | 3,00 | 1,0273 | ,5960 | ,236 |
| | 2,00 | 1,00 | -1,0189 | ,4612 | ,097 |
| | | 3,00 | 8,333E-03 | ,5882 | 1,000 |
| | 3,00 | 1,00 | -1,0273 | ,5960 | ,236 |
| | | 2,00 | -8,333E-03 | ,5882 | 1,000 |
| CONFUSÃO | 1,00 | 2,00 | ,1136 | ,6169 | ,983 |
| | | 3,00 | 1,2636 | ,7971 | ,293 |
| | 2,00 | 1,00 | -,1136 | ,6169 | ,983 |
| | | 3,00 | 1,1500 | ,7866 | ,351 |
| | 3,00 | 1,00 | -1,2636 | ,7971 | ,293 |
| | | 2,00 | -1,1500 | ,7866 | ,351 |

* The mean difference is significant at the .05 level.

Tabela 4.4. Comparação das variáveis da Condição Física Funcional e das Dimensões Psicológicas do POMS, entre escalões etários nos homens

ANOVA

| | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-----------|----------------|----------------|----|-------------|--------|------|
| IMC | Between Groups | 5,671 | 2 | 2,836 | ,212 | ,810 |
| | Within Groups | 548,566 | 41 | 13,380 | | |
| | Total | 554,237 | 43 | | | |
| FO.INF | Between Groups | 122,594 | 2 | 61,297 | 4,145 | ,024 |
| | Within Groups | 547,181 | 37 | 14,789 | | |
| | Total | 669,775 | 39 | | | |
| FO.SUP | Between Groups | 83,907 | 2 | 41,954 | 3,308 | ,048 |
| | Within Groups | 469,193 | 37 | 12,681 | | |
| | Total | 553,100 | 39 | | | |
| FL.INF | Between Groups | 1179,206 | 2 | 589,603 | 3,534 | ,039 |
| | Within Groups | 6173,069 | 37 | 166,840 | | |
| | Total | 7352,275 | 39 | | | |
| V.A.E | Between Groups | 353,071 | 2 | 176,536 | 25,246 | ,000 |
| | Within Groups | 251,731 | 36 | 6,993 | | |
| | Total | 604,802 | 38 | | | |
| FL.SUP | Between Groups | 331,813 | 2 | 165,907 | ,810 | ,452 |
| | Within Groups | 7576,462 | 37 | 204,769 | | |
| | Total | 7908,275 | 39 | | | |
| DIST | Between Groups | 97294,760 | 2 | 48647,380 | 4,888 | ,013 |
| | Within Groups | 368251,015 | 37 | 9952,730 | | |
| | Total | 465545,775 | 39 | | | |
| FC.6MIN | Between Groups | 3043,825 | 2 | 1521,913 | 3,821 | ,033 |
| | Within Groups | 12347,704 | 31 | 398,313 | | |
| | Total | 15391,529 | 33 | | | |
| DEPRESSÃO | Between Groups | 5,711 | 2 | 2,855 | ,151 | ,860 |
| | Within Groups | 662,184 | 35 | 18,920 | | |
| | Total | 667,895 | 37 | | | |
| TENSÃO | Between Groups | 7,444 | 2 | 3,722 | ,442 | ,646 |
| | Within Groups | 294,766 | 35 | 8,422 | | |
| | Total | 302,211 | 37 | | | |
| FADIGA | Between Groups | 7,954 | 2 | 3,977 | ,397 | ,675 |
| | Within Groups | 350,599 | 35 | 10,017 | | |
| | Total | 358,553 | 37 | | | |
| VIGOR | Between Groups | 37,296 | 2 | 18,648 | 1,251 | ,299 |
| | Within Groups | 521,678 | 35 | 14,905 | | |
| | Total | 558,974 | 37 | | | |
| IRRITAÇÃO | Between Groups | 2,427 | 2 | 1,214 | ,521 | ,598 |
| | Within Groups | 81,467 | 35 | 2,328 | | |
| | Total | 83,895 | 37 | | | |
| CONFUSÃO | Between Groups | 3,183 | 2 | 1,591 | ,547 | ,584 |
| | Within Groups | 101,870 | 35 | 2,911 | | |
| | Total | 105,053 | 37 | | | |

Tabela 4.5. Comparação das variáveis da Condição Física Funcional, entre escalões etários nos homens.

Multiple Comparisons -Post Hoc Tests

Scheffe

| Dependent Variable | (I) E.ETÁRIO | (J) E.ETÁRIO | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|------|
| IMC | 1,00 | 2,00 | -,7561 | 1,1625 | ,810 |
| | | 3,00 | -,3583 | 2,0219 | ,984 |
| | 2,00 | 1,00 | ,7561 | 1,1625 | ,810 |
| | | 3,00 | ,3977 | 1,9882 | ,980 |
| | 3,00 | 1,00 | ,3583 | 2,0219 | ,984 |
| | | 2,00 | -,3977 | 1,9882 | ,980 |
| FO.INF | 1,00 | 2,00 | 1,6374 | 1,2649 | ,441 |
| | | 3,00 | 6,7778(*) | 2,3982 | ,027 |
| | 2,00 | 1,00 | -1,6374 | 1,2649 | ,441 |
| | | 3,00 | 5,1404 | 2,3891 | ,113 |
| | 3,00 | 1,00 | -6,7778(*) | 2,3982 | ,027 |
| | | 2,00 | -5,1404 | 2,3891 | ,113 |
| FO.SUP | 1,00 | 2,00 | 1,1754 | 1,1713 | ,608 |
| | | 3,00 | 5,6667(*) | 2,2207 | ,050 |
| | 2,00 | 1,00 | -1,1754 | 1,1713 | ,608 |
| | | 3,00 | 4,4912 | 2,2123 | ,142 |
| | 3,00 | 1,00 | -5,6667(*) | 2,2207 | ,050 |
| | | 2,00 | -4,4912 | 2,2123 | ,142 |
| FL.INF | 1,00 | 2,00 | 9,1944 | 4,2485 | ,110 |
| | | 3,00 | 16,6944 | 8,0549 | ,131 |
| | 2,00 | 1,00 | -9,1944 | 4,2485 | ,110 |
| | | 3,00 | 7,5000 | 8,0246 | ,649 |
| | 3,00 | 1,00 | -16,6944 | 8,0549 | ,131 |
| | | 2,00 | -7,5000 | 8,0246 | ,649 |
| V.A.E | 1,00 | 2,00 | -,1272 | ,8814 | ,990 |
| | | 3,00 | -11,3528(*) | 1,6490 | ,000 |
| | 2,00 | 1,00 | ,1272 | ,8814 | ,990 |
| | | 3,00 | -11,2256(*) | 1,6490 | ,000 |
| | 3,00 | 1,00 | 11,3528(*) | 1,6490 | ,000 |
| | | 2,00 | 11,2256(*) | 1,6490 | ,000 |
| FL.SUP | 1,00 | 2,00 | -4,0146 | 4,7067 | ,698 |
| | | 3,00 | 6,0556 | 8,9237 | ,795 |
| | 2,00 | 1,00 | 4,0146 | 4,7067 | ,698 |
| | | 3,00 | 10,0702 | 8,8901 | ,532 |
| | 3,00 | 1,00 | -6,0556 | 8,9237 | ,795 |
| | | 2,00 | -10,0702 | 8,8901 | ,532 |
| DIST | 1,00 | 2,00 | 12,9152 | 32,8140 | ,926 |
| | | 3,00 | 192,3889(*) | 62,2134 | ,014 |
| | 2,00 | 1,00 | -12,9152 | 32,8140 | ,926 |
| | | 3,00 | 179,4737(*) | 61,9791 | ,023 |
| | 3,00 | 1,00 | -192,3889(*) | 62,2134 | ,014 |
| | | 2,00 | -179,4737(*) | 61,9791 | ,023 |
| FC.6MIN | 1,00 | 2,00 | -11,0875 | 7,1728 | ,316 |
| | | 3,00 | 21,9333 | 12,6224 | ,237 |
| | 2,00 | 1,00 | 11,0875 | 7,1728 | ,316 |
| | | 3,00 | 33,0208(*) | 12,5565 | ,044 |
| | 3,00 | 1,00 | -21,9333 | 12,6224 | ,237 |
| | | 2,00 | -33,0208(*) | 12,5565 | ,044 |

* The mean difference is significant at the .05 level.

Tabela 4.6. Comparação das variáveis das Dimensões Psicológicas do POMS, entre escalões etários nos homens.

**Multiple Comparisons
Post Hoc Tests**

Scheffe

| Dependent Variable | (I) E.ETÁRIO | (J) E.ETÁRIO | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|------|
| DEPRESSÃO | 1,00 | 2,00 | -,2632 | 1,4521 | ,984 |
| | | 3,00 | 1,5000 | 3,2516 | ,899 |
| | 2,00 | 1,00 | ,2632 | 1,4521 | ,984 |
| | | 3,00 | 1,7632 | 3,2335 | ,862 |
| | 3,00 | 1,00 | -1,5000 | 3,2516 | ,899 |
| | | 2,00 | -1,7632 | 3,2335 | ,862 |
| TENSÃO | 1,00 | 2,00 | -,2322 | ,9688 | ,972 |
| | | 3,00 | 1,7941 | 2,1694 | ,713 |
| | 2,00 | 1,00 | ,2322 | ,9688 | ,972 |
| | | 3,00 | 2,0263 | 2,1574 | ,647 |
| | 3,00 | 1,00 | -1,7941 | 2,1694 | ,713 |
| | | 2,00 | -2,0263 | 2,1574 | ,647 |
| FADIGA | 1,00 | 2,00 | -,8483 | 1,0566 | ,727 |
| | | 3,00 | ,4412 | 2,3660 | ,983 |
| | 2,00 | 1,00 | ,8483 | 1,0566 | ,727 |
| | | 3,00 | 1,2895 | 2,3528 | ,861 |
| | 3,00 | 1,00 | -,4412 | 2,3660 | ,983 |
| | | 2,00 | -1,2895 | 2,3528 | ,861 |
| VIGOR | 1,00 | 2,00 | 1,4149 | 1,2889 | ,553 |
| | | 3,00 | 3,9412 | 2,8861 | ,403 |
| | 2,00 | 1,00 | -1,4149 | 1,2889 | ,553 |
| | | 3,00 | 2,5263 | 2,8700 | ,682 |
| | 3,00 | 1,00 | -3,9412 | 2,8861 | ,403 |
| | | 2,00 | -2,5263 | 2,8700 | ,682 |
| IRRITAÇÃO | 1,00 | 2,00 | -9,9071E-02 | ,5093 | ,981 |
| | | 3,00 | 1,0588 | 1,1405 | ,653 |
| | 2,00 | 1,00 | 9,907E-02 | ,5093 | ,981 |
| | | 3,00 | 1,1579 | 1,1342 | ,598 |
| | 3,00 | 1,00 | -1,0588 | 1,1405 | ,653 |
| | | 2,00 | -1,1579 | 1,1342 | ,598 |
| CONFUSÃO | 1,00 | 2,00 | -,1981 | ,5696 | ,941 |
| | | 3,00 | 1,1176 | 1,2753 | ,684 |
| | 2,00 | 1,00 | ,1981 | ,5696 | ,941 |
| | | 3,00 | 1,3158 | 1,2683 | ,589 |
| | 3,00 | 1,00 | -1,1176 | 1,2753 | ,684 |
| | | 2,00 | -1,3158 | 1,2683 | ,589 |

* The mean difference is significant at the .05 level.

ANEXO 5

Tabela 5.1 - Média e desvio padrão das variáveis da Condição Física Funcional e Dimensões Psicológicas do POMS entre homens e mulheres

Descriptives

| | | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval for Mean | | Minimum | Maximum |
|--------------|-------|-----|----------|----------------|------------|----------------------------------|-------------|---------|---------|
| | | | | | | Lower Bound | Upper Bound | | |
| IMC | 1,00 | 69 | 30,2797 | 4,5935 | ,5530 | 29,1762 | 31,3832 | 21,10 | 45,50 |
| | 2,00 | 44 | 28,4773 | 3,5902 | ,5412 | 27,3858 | 29,5688 | 21,50 | 40,50 |
| | Total | 113 | 29,5779 | 4,3057 | ,4050 | 28,7753 | 30,3804 | 21,10 | 45,50 |
| FO.INF | 1,00 | 59 | 12,1017 | 3,6892 | ,4803 | 11,1403 | 13,0631 | 5,00 | 22,00 |
| | 2,00 | 40 | 12,8250 | 4,1441 | ,6552 | 11,4996 | 14,1504 | ,00 | 21,00 |
| | Total | 99 | 12,3939 | 3,8751 | ,3895 | 11,6211 | 13,1668 | ,00 | 22,00 |
| FO.SUP | 1,00 | 59 | 14,5254 | 3,7063 | ,4825 | 13,5596 | 15,4913 | 7,00 | 26,00 |
| | 2,00 | 40 | 15,3500 | 3,7659 | ,5954 | 14,1456 | 16,5544 | 7,00 | 26,00 |
| | Total | 99 | 14,8586 | 3,7335 | ,3752 | 14,1140 | 15,6032 | 7,00 | 26,00 |
| FL.INF | 1,00 | 59 | -5,3203 | 13,0138 | 1,6943 | -8,7118 | -1,9289 | -31,00 | 35,00 |
| | 2,00 | 40 | -17,9250 | 13,7303 | 2,1709 | -22,3161 | -13,5339 | -51,00 | 6,00 |
| | Total | 99 | -10,4131 | 14,6254 | 1,4699 | -13,3301 | -7,4961 | -51,00 | 35,00 |
| V.A.E | 1,00 | 59 | 8,5849 | 3,5113 | ,4571 | 7,6699 | 9,5000 | 4,79 | 20,34 |
| | 2,00 | 39 | 8,1326 | 3,9895 | ,6388 | 6,8393 | 9,4258 | 4,52 | 21,25 |
| | Total | 98 | 8,4049 | 3,6955 | ,3733 | 7,6640 | 9,1458 | 4,52 | 21,25 |
| FL.SUP | 1,00 | 59 | -19,5000 | 10,2642 | 1,3363 | -22,1749 | -16,8251 | -44,00 | 5,00 |
| | 2,00 | 40 | -29,3250 | 14,2400 | 2,2515 | -33,8792 | -24,7708 | -70,00 | ,00 |
| | Total | 99 | -23,4697 | 12,9046 | 1,2970 | -26,0435 | -20,8959 | -70,00 | 5,00 |
| DIST | 1,00 | 59 | 358,6441 | 94,8730 | 12,3514 | 333,9200 | 383,3681 | 145,00 | 552,00 |
| | 2,00 | 40 | 405,8250 | 109,2569 | 17,2750 | 370,8829 | 440,7671 | 204,00 | 590,00 |
| | Total | 99 | 377,7071 | 103,0486 | 10,3568 | 357,1544 | 398,2597 | 145,00 | 590,00 |
| FC.6MIN | 1,00 | 54 | 115,0000 | 21,0955 | 2,8707 | 109,2420 | 120,7580 | 82,00 | 168,00 |
| | 2,00 | 34 | 118,8824 | 21,5965 | 3,7038 | 111,3470 | 126,4177 | 82,00 | 172,00 |
| | Total | 88 | 116,5000 | 21,2516 | 2,2654 | 111,9972 | 121,0028 | 82,00 | 172,00 |
| DEPRES SÃ | 1,00 | 56 | 4,4464 | 4,3356 | ,5794 | 3,2854 | 5,6075 | ,00 | 14,00 |
| | 2,00 | 38 | 4,0526 | 4,2487 | ,6892 | 2,6561 | 5,4491 | ,00 | 17,00 |
| | Total | 94 | 4,2872 | 4,2821 | ,4417 | 3,4102 | 5,1643 | ,00 | 17,00 |
| TENSÃO | 1,00 | 56 | 4,5357 | 3,4110 | ,4558 | 3,6222 | 5,4492 | ,00 | 12,00 |
| | 2,00 | 38 | 3,3158 | 2,8579 | ,4636 | 2,3764 | 4,2552 | ,00 | 10,00 |
| | Total | 94 | 4,0426 | 3,2393 | ,3341 | 3,3791 | 4,7060 | ,00 | 12,00 |
| FADIGA | 1,00 | 56 | 5,0536 | 4,1183 | ,5503 | 3,9507 | 6,1565 | ,00 | 16,00 |
| | 2,00 | 38 | 3,3421 | 3,1130 | ,5050 | 2,3189 | 4,3653 | ,00 | 12,00 |
| | Total | 94 | 4,3617 | 3,8209 | ,3941 | 3,5791 | 5,1443 | ,00 | 16,00 |
| VIGOR | 1,00 | 56 | 7,2321 | 3,5726 | ,4774 | 6,2754 | 8,1889 | ,00 | 16,00 |
| | 2,00 | 38 | 7,0263 | 3,8868 | ,6305 | 5,7487 | 8,3039 | ,00 | 16,00 |
| | Total | 94 | 7,1489 | 3,6836 | ,3799 | 6,3945 | 7,9034 | ,00 | 16,00 |
| IRRITAÇ Ã | 1,00 | 56 | 1,1071 | 1,6145 | ,2157 | ,6748 | 1,5395 | ,00 | 8,00 |
| | 2,00 | 38 | 1,0526 | 1,5058 | ,2443 | ,5577 | 1,5476 | ,00 | 6,00 |
| | Total | 94 | 1,0851 | 1,5634 | ,1613 | ,7649 | 1,4053 | ,00 | 8,00 |
| CONFUS ÃO | 1,00 | 56 | 1,5893 | 2,1043 | ,2812 | 1,0257 | 2,1528 | ,00 | 8,00 |
| | 2,00 | 38 | 1,1579 | 1,6850 | ,2733 | ,6040 | 1,7117 | ,00 | 6,00 |
| | Total | 94 | 1,4149 | 1,9478 | ,2009 | 1,0160 | 1,8138 | ,00 | 8,00 |

Tabela 5.2 - Comparação das variáveis Condição Física Funcional e Dimensões Psicológicas do POMS, entre homens e mulheres.

ANOVA

| | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-----------|----------------|----------------|-----|-------------|--------|------|
| IMC | Between Groups | 87,286 | 1 | 87,286 | 4,871 | ,029 |
| | Within Groups | 1989,069 | 111 | 17,920 | | |
| | Total | 2076,355 | 112 | | | |
| FO.INF | Between Groups | 12,472 | 1 | 12,472 | ,829 | ,365 |
| | Within Groups | 1459,165 | 97 | 15,043 | | |
| | Total | 1471,636 | 98 | | | |
| FO.SUP | Between Groups | 16,208 | 1 | 16,208 | 1,165 | ,283 |
| | Within Groups | 1349,812 | 97 | 13,916 | | |
| | Total | 1366,020 | 98 | | | |
| FL.INF | Between Groups | 3787,382 | 1 | 3787,382 | 21,390 | ,000 |
| | Within Groups | 17175,131 | 97 | 177,063 | | |
| | Total | 20962,513 | 98 | | | |
| V.A.E | Between Groups | 4,804 | 1 | 4,804 | ,349 | ,556 |
| | Within Groups | 1319,893 | 96 | 13,749 | | |
| | Total | 1324,697 | 97 | | | |
| FL.SUP | Between Groups | 2301,134 | 1 | 2301,134 | 15,922 | ,000 |
| | Within Groups | 14018,775 | 97 | 144,523 | | |
| | Total | 16319,909 | 98 | | | |
| DIST | Between Groups | 53065,205 | 1 | 53065,205 | 5,212 | ,025 |
| | Within Groups | 987597,300 | 97 | 10181,415 | | |
| | Total | 1040662,505 | 98 | | | |
| FC.6MIN | Between Groups | 314,471 | 1 | 314,471 | ,694 | ,407 |
| | Within Groups | 38977,529 | 86 | 453,227 | | |
| | Total | 39292,000 | 87 | | | |
| DEPRESSÃO | Between Groups | 3,511 | 1 | 3,511 | ,190 | ,664 |
| | Within Groups | 1701,734 | 92 | 18,497 | | |
| | Total | 1705,245 | 93 | | | |
| TENSÃO | Between Groups | 33,691 | 1 | 33,691 | 3,290 | ,073 |
| | Within Groups | 942,139 | 92 | 10,241 | | |
| | Total | 975,830 | 93 | | | |
| FADIGA | Between Groups | 66,310 | 1 | 66,310 | 4,724 | ,032 |
| | Within Groups | 1291,392 | 92 | 14,037 | | |
| | Total | 1357,702 | 93 | | | |
| VIGOR | Between Groups | ,959 | 1 | ,959 | ,070 | ,792 |
| | Within Groups | 1260,956 | 92 | 13,706 | | |
| | Total | 1261,915 | 93 | | | |
| IRRITAÇÃO | Between Groups | 6,727E-02 | 1 | 6,727E-02 | ,027 | ,869 |
| | Within Groups | 227,252 | 92 | 2,470 | | |
| | Total | 227,319 | 93 | | | |
| CONFUSÃO | Between Groups | 4,213 | 1 | 4,213 | 1,112 | ,294 |
| | Within Groups | 348,606 | 92 | 3,789 | | |
| | Total | 352,819 | 93 | | | |

ANEXO 6

Tabela 6.1 – Média e desvio padrão das variáveis da Condição Física Funcional e Dimensões Psicológicas do POMS, nas mulheres

Descriptive Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-----------|----------|----------------|----|
| IMC | 30,2797 | 4,5935 | 69 |
| FO.INF | 12,1017 | 3,6892 | 59 |
| FO.SUP | 14,5254 | 3,7063 | 59 |
| FL.INF | -5,3203 | 13,0138 | 59 |
| V.A.E | 8,5849 | 3,5113 | 59 |
| FL.SUP | -19,5000 | 10,2642 | 59 |
| DIST | 358,6441 | 94,8730 | 59 |
| FC.6MIN | 115,0000 | 21,0955 | 54 |
| DEPRESSÃO | 4,4464 | 4,3356 | 56 |
| TENSÃO | 4,5357 | 3,4110 | 56 |
| FADIGA | 5,0536 | 4,1183 | 56 |
| VIGOR | 7,2321 | 3,5726 | 56 |
| IRRITAÇÃO | 1,1071 | 1,6145 | 56 |
| CONFUSÃO | 1,5893 | 2,1043 | 56 |

Tabela 6.2 – Média e desvio padrão das variáveis da Condição Física Funcional e Dimensões Psicológicas do POMS, nos homens.

Descriptive Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-----------|----------|----------------|----|
| IMC | 28,4773 | 3,5902 | 44 |
| FO.INF | 12,8250 | 4,1441 | 40 |
| FO.SUP | 15,3500 | 3,7659 | 40 |
| FL.INF | -17,9250 | 13,7303 | 40 |
| V.A.E | 8,1326 | 3,9895 | 39 |
| FL.SUP | -29,3250 | 14,2400 | 40 |
| DIST | 405,8250 | 109,2569 | 40 |
| FC.6MIN | 118,8824 | 21,5965 | 34 |
| DEPRESSÃO | 4,0526 | 4,2487 | 38 |
| TENSÃO | 3,3158 | 2,8579 | 38 |
| FADIGA | 3,3421 | 3,1130 | 38 |
| VIGOR | 7,0263 | 3,8868 | 38 |
| IRRITAÇÃO | 1,0526 | 1,5058 | 38 |
| CONFUSÃO | 1,1579 | 1,6850 | 38 |

ANEXO 7

Tabela 7.1 – Correlação entre a Condição Física Funcional e as Dimensões Psicológicas do POMS nas mulheres.

Correlations

| | | IMC | FO.INF | FO.SUP | FL.INF | V.A.E | FL.SUP | DIST | FC.6MIN | DEPRESS | TENSÃO | FADIGA | VIGOR | IRRITAÇÃ | CONFUSÃO |
|--------|---------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|----------|----------|-------|----------|----------|
| IMC | Pearson Correlation | 1,000 | ,103 | ,196 | -,131 | ,103 | -,289(*) | -,060 | ,157 | ,342(*) | ,385(**) | ,439(**) | ,073 | ,524(**) | ,410(**) |
| | Sig. (2-tailed) | , | ,438 | ,136 | ,324 | ,438 | ,026 | ,650 | ,257 | ,011 | ,004 | ,001 | ,598 | ,000 | ,002 |
| | N | 69 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| FO.INF | Pearson Correlation | ,103 | 1,000 | ,795(**) | ,303(*) | -,646(**) | ,256 | ,573(**) | ,137 | ,003 | -,078 | ,044 | ,005 | ,209 | ,050 |
| | Sig. (2-tailed) | ,438 | , | ,000 | ,020 | ,000 | ,051 | ,000 | ,324 | ,985 | ,607 | ,769 | ,975 | ,163 | ,744 |
| | N | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| FO.SUP | Pearson Correlation | ,196 | ,795(**) | 1,000 | ,193 | -,512(**) | ,259(*) | ,463(**) | ,213 | ,177 | ,126 | ,060 | ,019 | ,320(*) | ,168 |
| | Sig. (2-tailed) | ,136 | ,000 | , | ,143 | ,000 | ,048 | ,000 | ,123 | ,240 | ,404 | ,693 | ,902 | ,030 | ,264 |
| | N | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| FL.INF | Pearson Correlation | -,131 | ,303(*) | ,193 | 1,000 | -,288(*) | ,401(**) | ,280(*) | ,099 | ,262 | ,109 | ,206 | -,107 | ,204 | ,064 |
| | Sig. (2-tailed) | ,324 | ,020 | ,143 | , | ,027 | ,002 | ,031 | ,475 | ,078 | ,470 | ,169 | ,478 | ,175 | ,673 |
| | N | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| V.A.E | Pearson Correlation | ,103 | -,646(**) | -,512(**) | -,288(*) | 1,000 | -,448(**) | ,843(**) | -,234 | ,215 | ,179 | ,122 | -,207 | -,030 | -,064 |
| | Sig. (2-tailed) | ,438 | ,000 | ,000 | ,027 | , | ,000 | ,000 | ,088 | ,151 | ,234 | ,418 | ,169 | ,842 | ,671 |
| | N | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| FL.SUP | Pearson Correlation | -,289(*) | ,256 | ,259(*) | ,401(**) | -,448(**) | 1,000 | ,478(**) | ,095 | -,185 | -,153 | -,241 | ,260 | -,207 | -,045 |
| | Sig. (2-tailed) | ,026 | ,051 | ,048 | ,002 | ,000 | , | ,000 | ,492 | ,218 | ,309 | ,107 | ,080 | ,167 | ,765 |
| | N | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| DIST | Pearson Correlation | -,060 | ,573(**) | ,463(**) | ,280(*) | -,843(**) | ,478(**) | 1,000 | ,336(*) | -,099 | -,124 | -,094 | ,196 | ,046 | ,014 |
| | Sig. (2-tailed) | ,650 | ,000 | ,000 | ,031 | ,000 | ,000 | , | ,013 | ,513 | ,410 | ,533 | ,191 | ,762 | ,927 |
| | N | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 54 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|----------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| FC.6MIN | Pearson Correlation | ,157 | ,137 | ,213 | ,099 | -,234 | ,095 | ,336(*) | 1,000 | ,419(**) | ,051 | ,152 | ,304 | ,219 | ,015 |
| | Sig. (2-tailed) | ,257 | ,324 | ,123 | ,475 | ,088 | ,492 | ,013 | , | ,006 | ,750 | ,344 | ,053 | ,169 | ,924 |
| | N | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| DEPRES SÃ | Pearson Correlation | ,342(*) | ,003 | ,177 | ,262 | ,215 | -,185 | -,099 | ,419(**) | 1,000 | ,644(**) | ,673(**) | -,313(*) | ,549(**) | ,479(**) |
| | Sig. (2-tailed) | ,011 | ,985 | ,240 | ,078 | ,151 | ,218 | ,513 | ,006 | , | ,000 | ,000 | ,019 | ,000 | ,000 |
| | N | 55 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| TENSÃO | Pearson Correlation | ,385(**) | -,078 | ,126 | ,109 | ,179 | -,153 | -,124 | ,051 | ,644(**) | 1,000 | ,760(**) | -,207 | ,455(**) | ,561(**) |
| | Sig. (2-tailed) | ,004 | ,607 | ,404 | ,470 | ,234 | ,309 | ,410 | ,750 | ,000 | , | ,000 | ,125 | ,000 | ,000 |
| | N | 55 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| FADIGA | Pearson Correlation | ,439(**) | ,044 | ,060 | ,206 | ,122 | -,241 | -,094 | ,152 | ,673(**) | ,760(**) | 1,000 | -,258 | ,464(**) | ,349(**) |
| | Sig. (2-tailed) | ,001 | ,769 | ,693 | ,169 | ,418 | ,107 | ,533 | ,344 | ,000 | ,000 | , | ,055 | ,000 | ,008 |
| | N | 55 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| VIGOR | Pearson Correlation | ,073 | ,005 | ,019 | -,107 | -,207 | ,260 | ,196 | ,304 | -,313(*) | -,207 | -,258 | 1,000 | -,165 | -,043 |
| | Sig. (2-tailed) | ,598 | ,975 | ,902 | ,478 | ,169 | ,080 | ,191 | ,053 | ,019 | ,125 | ,055 | , | ,224 | ,755 |
| | N | 55 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| IRRITAÇ Ã | Pearson Correlation | ,524(**) | ,209 | ,320(*) | ,204 | -,030 | -,207 | ,046 | ,219 | ,549(**) | ,455(**) | ,464(**) | -,165 | 1,000 | ,377(**) |
| | Sig. (2-tailed) | ,000 | ,163 | ,030 | ,175 | ,842 | ,167 | ,762 | ,169 | ,000 | ,000 | ,000 | ,224 | , | ,004 |
| | N | 55 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| CONFUS ÃO | Pearson Correlation | ,410(**) | ,050 | ,168 | ,064 | -,064 | -,045 | ,014 | ,015 | ,479(**) | ,561(**) | ,349(**) | -,043 | ,377(**) | 1,000 |
| | Sig. (2-tailed) | ,002 | ,744 | ,264 | ,673 | ,671 | ,765 | ,927 | ,924 | ,000 | ,000 | ,008 | ,755 | ,004 | , |
| | N | 55 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 41 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela 7.2 – Correlação entre a Condição Física Funcional e as Dimensões Psicológicas do POMS, nos homens.

Correlations

| | | IMC | FO.INF | FO.SUP | FL.INF | V.A.E | FL.SUP | DIST | FC.6MIN | DEP. | TENSÃO | FAGIGA | VIGOR | IRRITAÇÃO | CONFUSÃO |
|--------|---------------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|-------|--------|----------|-------|-----------|----------|
| IMC | Pearson Correlation | 1,000 | -,200 | -,176 | ,047 | -,007 | -,340(*) | -,288 | -,095 | -,007 | -,109 | ,000 | ,172 | -,132 | -,087 |
| | Sig. (2-tailed) | , | ,216 | ,277 | ,774 | ,965 | ,032 | ,071 | ,593 | ,967 | ,515 | ,999 | ,301 | ,430 | ,602 |
| | N | 44 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| FO.INF | Pearson Correlation | -,200 | 1,000 | ,701(**) | ,293 | -,673(**) | ,379(*) | ,656(**) | ,113 | -,023 | ,208 | ,061 | ,218 | ,196 | ,035 |
| | Sig. (2-tailed) | ,216 | , | ,000 | ,067 | ,000 | ,016 | ,000 | ,524 | ,895 | ,231 | ,729 | ,208 | ,259 | ,841 |
| | N | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| FO.SUP | Pearson Correlation | -,176 | ,701(**) | 1,000 | ,061 | -,554(**) | ,436(**) | ,540(**) | ,285 | -,007 | ,062 | -,113 | ,301 | -,002 | -,017 |
| | Sig. (2-tailed) | ,277 | ,000 | , | ,710 | ,000 | ,005 | ,000 | ,102 | ,969 | ,724 | ,518 | ,079 | ,991 | ,921 |
| | N | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| FL.INF | Pearson Correlation | ,047 | ,293 | ,061 | 1,000 | -,229 | ,185 | ,268 | -,276 | ,126 | ,181 | ,027 | ,037 | ,125 | ,093 |
| | Sig. (2-tailed) | ,774 | ,067 | ,710 | , | ,162 | ,253 | ,095 | ,113 | ,471 | ,297 | ,877 | ,831 | ,475 | ,596 |
| | N | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| V.A.E | Pearson Correlation | -,007 | -,673(**) | -,554(**) | -,229 | 1,000 | -,355(*) | -,840(**) | -,376(*) | ,091 | -,197 | -,067 | -,254 | -,257 | -,132 |
| | Sig. (2-tailed) | ,965 | ,000 | ,000 | ,162 | , | ,027 | ,000 | ,031 | ,607 | ,263 | ,707 | ,147 | ,142 | ,456 |
| | N | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| FL.SUP | Pearson Correlation | -,340(*) | ,379(*) | ,436(**) | ,185 | -,355(*) | 1,000 | ,569(**) | ,069 | -,251 | -,317 | -,392(*) | -,126 | -,097 | -,360(*) |
| | Sig. (2-tailed) | ,032 | ,016 | ,005 | ,253 | ,027 | , | ,000 | ,699 | ,146 | ,064 | ,020 | ,472 | ,581 | ,034 |
| | N | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| DIST | Pearson Correlation | -,288 | ,656(**) | ,540(**) | ,268 | -,840(**) | ,569(**) | 1,000 | ,140 | -,043 | ,142 | -,018 | ,081 | ,195 | ,056 |
| | Sig. (2-tailed) | ,071 | ,000 | ,000 | ,095 | ,000 | ,000 | , | ,430 | ,807 | ,417 | ,917 | ,645 | ,261 | ,750 |
| | N | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|
| FC.6MIN | Pearson Correlation | -.095 | ,113 | ,285 | -.276 | -.376(*) | ,069 | ,140 | 1,000 | -.326 | -.115 | -.355 | ,233 | -.114 | -.175 |
| | Sig. (2-tailed) | ,593 | ,524 | ,102 | ,113 | ,031 | ,699 | ,430 | , | ,084 | ,551 | ,058 | ,224 | ,556 | ,363 |
| | N | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| DEPRES SÃ | Pearson Correlation | -.007 | -.023 | -.007 | ,126 | ,091 | -.251 | -.043 | -.326 | 1,000 | ,608(**) | ,783(**) | -.273 | ,528(**) | ,799(**) |
| | Sig. (2-tailed) | ,967 | ,895 | ,969 | ,471 | ,607 | ,146 | ,807 | ,084 | , | ,000 | ,000 | ,097 | ,001 | ,000 |
| | N | 38 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 29 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| TENSÃO | Pearson Correlation | -.109 | ,208 | ,062 | ,181 | -.197 | -.317 | ,142 | -.115 | ,608(**) | 1,000 | ,704(**) | ,033 | ,593(**) | ,730(**) |
| | Sig. (2-tailed) | ,515 | ,231 | ,724 | ,297 | ,263 | ,064 | ,417 | ,551 | ,000 | , | ,000 | ,843 | ,000 | ,000 |
| | N | 38 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 29 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| FADIGA | Pearson Correlation | ,000 | ,061 | -.113 | ,027 | -.067 | -.392(*) | -.018 | -.355 | ,783(**) | ,704(**) | 1,000 | -.186 | ,573(**) | ,819(**) |
| | Sig. (2-tailed) | ,999 | ,729 | ,518 | ,877 | ,707 | ,020 | ,917 | ,058 | ,000 | ,000 | , | ,263 | ,000 | ,000 |
| | N | 38 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 29 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| VIGOR | Pearson Correlation | ,172 | ,218 | ,301 | ,037 | -.254 | -.126 | ,081 | ,233 | -.273 | ,033 | -.186 | 1,000 | -.199 | -.162 |
| | Sig. (2-tailed) | ,301 | ,208 | ,079 | ,831 | ,147 | ,472 | ,645 | ,224 | ,097 | ,843 | ,263 | , | ,231 | ,332 |
| | N | 38 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 29 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| IRRITAÇ Ã | Pearson Correlation | -.132 | ,196 | -.002 | ,125 | -.257 | -.097 | ,195 | -.114 | ,528(**) | ,593(**) | ,573(**) | -.199 | 1,000 | ,551(**) |
| | Sig. (2-tailed) | ,430 | ,259 | ,991 | ,475 | ,142 | ,581 | ,261 | ,556 | ,001 | ,000 | ,000 | ,231 | , | ,000 |
| | N | 38 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 29 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| CONFUS ÃO | Pearson Correlation | -.087 | ,035 | -.017 | ,093 | -.132 | -.360(*) | ,056 | -.175 | ,799(**) | ,730(**) | ,819(**) | -.162 | ,551(**) | 1,000 |
| | Sig. (2-tailed) | ,602 | ,841 | ,921 | ,596 | ,456 | ,034 | ,750 | ,363 | ,000 | ,000 | ,000 | ,332 | ,000 | , |
| | N | 38 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 29 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

