

Tabela A. 17. Dados sobre a alteração da entese nos membros superiores na amostra SLCR.

Local/inserção	lado	Robustez						Lesões osteofíticas					Lesões osteolíticas						
		1a	1b	1c	2	3	n	0	1	2	3	n	%	0	1	2	3	n	%
L. costoclavicular (clavícula)	D	6	6	11	8	5	36	35	1	0	0	36	3	22	5	2	7	36	39
	E	10	9	6	5	2	32	32	0	0	0	32	0	22	3	3	4	32	31
L. conoide (clavícula)	D	4	11	13	6	0	34	31	1	0	0	32	3	28	4	0	0	32	13
	E	4	8	11	3	0	26	25	0	0	0	25	0	23	2	0	0	25	8
L. trapezoide (clavícula)	D	18	8	8	1	1	36	36	0	0	0	36	0	31	5	0	0	36	14
	E	18	10	1	2	0	31	31	0	0	0	31	0	27	4	0	0	31	13
M. <i>pectoralis major</i> (clavícula)	D	5	14	4	12	2	37	35	2	0	0	37	5	37	0	0	0	37	0
	E	6	10	8	10	1	35	35	0	0	0	35	0	34	1	0	0	35	3
M. <i>deltoideus</i> (clavícula)	D	3	14	11	8	1	37	36	1	0	0	37	3	28	5	2	1	36	22
	E	6	10	11	5	1	33	31	2	0	0	33	6	29	3	1	0	33	12
M. <i>pectoralis major</i> (úmero)	D	7	19	12	0	1	39	38	1	0	0	39	3	35	1	0	3	39	10
	E	9	17	4	1	1	32	31	1	0	0	32	3	29	0	0	3	32	9
M. <i>latissimus dorsii/teres</i> (úmero)	D	29	6	5	1	0	41	41	0	0	0	41	0	38	0	0	3	41	7
	E	26	5	0	2	0	33	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0
M. <i>deltoideus</i> (úmero)	D	21	8	9	1	2	41	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0
	E	19	10	3	4	0	36	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0
M. <i>brachioradialis</i> (úmero)	D	8	7	8	2	5	30	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0
	E	8	5	5	8	1	27	26	0	1	0	27	4	27	0	0	0	27	0
Epicôndilo medial (úmero)	D	-	-	-	-	-	-	19	2	0	1	22	14	22	0	0	0	22	0
	E	-	-	-	-	-	-	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0
Epicôndilo lateral (úmero)	D	-	-	-	-	-	-	14	2	3	0	19	26	19	0	0	0	19	0
	E	-	-	-	-	-	-	17	2	0	0	19	11	19	0	0	0	19	0
M. <i>tríceps brachii</i> (escápula)	D	3	6	5	2	3	19	19	0	0	0	19	0	9	8	2	0	19	53
	E	2	5	2	2	1	12	12	0	0	0	12	0	10	2	0	0	12	17
M. <i>deltoideus</i> (escápula)	D	-	-	-	-	-	-	10	0	0	0	10	0	9	1	0	0	10	10
	E	-	-	-	-	-	-	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
M. <i>biceps coraco brachial</i> (escápula)	D	-	-	-	-	-	-	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
	E	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	2	0	1	1	0	0	2	50
M. <i>tríceps brachii</i> (rádio)	D	17	12	5	0	1	35	28	3	1	2	34	18	24	8	0	2	34	29
	E	12	9	7	0	2	30	23	7	0	1	31	26	22	5	3	1	31	29
M. <i>pronator teres</i> (rádio)	D	30	5	2	0	0	37	35	1	1	0	37	5	37	0	0	0	37	0
	E	26	7	2	1	0	36	34	1	1	0	36	6	36	0	0	0	36	0
Interosseous membrane (rádio)	D	9	9	18	4	0	40	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0
	E	10	12	12	5	0	39	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0
M. <i>tríceps brachii</i> (ulna)	D	7	10	1	6	2	26	23	1	2	0	26	12	26	0	0	0	26	0
	E	7	10	1	2	1	21	20	1	0	0	21	5	21	0	0	0	21	0
M. <i>brachialis</i> (ulna)	D	10	21	4	3	1	39	36	3	0	0	39	8	37	1	0	1	39	5
	E	12	21	3	3	0	39	37	2	0	0	39	5	37	2	0	0	39	5
M. <i>supinator</i> (ulna)	D	16	16	7	2	0	41	38	2	0	1	41	7	39	1	0	0	40	3
	E	14	23	2	2	0	41	39	1	0	0	40	3	39	0	1	0	40	2

Legenda: L= ligamento; M=músculo; % = percentagem total das lesões osteolíticas e osteofíticas; n = número total observado.

Tabela A. 18. Dados sobre a alteração da entese nos membros inferiores e da ráquis da amostra SLCR

Local/inserção	lado	Robustez						Lesões osteofíticas				Lesões osteolíticas							
		1a	1b	1c	2	3	n	0	1	2	3	n	%	0	1	2	3	n	%
<i>M. gluteus maximus</i> (fémur)	D	11	15	8	3	1	38	36	1	1	0	38	6	32	6	0	0	38	16
	E	12	12	6	4	1	35	34	0	1	0	35	3	30	5	0	0	35	14
<i>M. iliopsoas</i> (fémur)	D	7	2	2	0	2	13	11	1	1	0	13	4	12	1	0	0	13	8
	E	10	4	5	3	2	24	18	5	0	1	24	25	21	2	1	0	24	13
<i>M. gluteus</i> médios (fémur)	D	-	-	-	-	-	-	10	0	0	1	11	9	10	1	0	0	11	9
	E	-	-	-	-	-	-	12	0	0	0	12	0	11	0	1	0	12	8
Fossa digital (fémur)	D	-	-	-	-	-	-	13	5	4	0	22	41	22	0	0	0	22	0
	E	-	-	-	-	-	-	12	7	2	2	23	48	23	0	0	0	23	0
<i>M. vastus medialis</i> (fémur)	D	29	5	1	3	0	38	36	2	0	0	38	5	38	0	0	0	38	0
	E	24	10	1	1	0	36	34	2	0	0	36	6	36	0	0	0	36	0
L. rotuliano e quadrilátero (patela)	D	8	5	4	0	0	17	12	4	1	0	17	29	17	0	0	0	17	0
	E	14	2	1	0	0	17	15	1	1	0	17	12	17	0	0	0	17	0
Tendão quadrilátero (tíbia)	D	7	3	6	4	2	22	16	2	4	0	22	27	22	0	0	0	22	0
	E	4	4	6	6	1	21	15	3	0	2	20	25	21	0	0	0	21	0
<i>M. soleus</i> (tíbia)	D	15	9	1	3	2	30	28	1	0	1	30	7	26	1	2	1	30	13
	E	14	9	3	2	2	30	29	1	0	0	30	3	28	0	0	2	30	7
Tendão de Aquiles (calcâneo)	D	1	1	3	2	0	7	3	4	0	0	7	57	7	0	0	0	7	0
	E	0	1	1	3	0	5	2	1	0	0	3	33	4	0	0	0	4	0

Cervicais - presença de espigas laminares 1/163 – 0,7%

Torácicas - presença de espigas laminares 340/420 – 81%

Lombares - presença de espigas laminares 58/154 – 38%

Legenda: L= ligamento; M=músculo; % = percentagem total das lesões osteofíticas e osteolíticas; n = número total observado.

Tabela A. 19. Avaliação da robustez por lateralidade na amostra SLCR.

Robustez vs Lateralidade	D		E	
	\bar{x}	\bar{x}	<i>t</i>	α
L. costoclavicular (clavícula)	3,10	2,45	3,378	0,002
L. conoide (clavícula)	2,61	2,48	0,72	0,479
L. trapezoide (clavícula)	1,77	1,60	1,306	0,202
<i>M. pectoralis major</i> (clavícula)	2,78	2,75	0,197	0,845
<i>M. deltoideus</i> (clavícula)	2,65	2,58	0,441	0,662
<i>M. pectoralis major</i> (úmero)	2,20	2,00	1,439	0,161
<i>M. latissimus dorsi/teres</i> (úmero)	1,42	1,35	0,701	0,489
<i>M. deltoideus</i> (úmero)	1,94	1,8	1,304	0,201
<i>M. brachioradialis</i> (úmero)	2,88	2,67	0,961	0,347
Epicôndilo medial (úmero)	-	-	-	-

Legenda: D=direito; E=esquerdo; \bar{x} = média; *t* = teste; α =significância = <0,05 assinalada a negrito.

Tabela A. 20. Continuação da avaliação da robustez por lateralidade na amostra SLCR.

Robustez vs Lateralidade	D	E		
Local/inserção	\bar{x}	\bar{x}	<i>t</i>	α
Epicôndilo lateral (úmero)	-	-	-	-
<i>M. triceps brachii</i> (escápula)	3,1	2,73	1,305	0,221
<i>M. deltoideus</i> (escápula)	-	-	-	-
<i>M. biceps coraco brachial</i> (escápula)	-	-	-	-
<i>M. triceps brachii</i> (rádio)	1,9	2,04	-1,224	0,232
<i>M. pronator teres</i> (rádio)	1,2	1,28	-8,12	0,423
<i>Interosseous membrane</i> (rádio)	2,4	2,25	1,484	0,147
<i>M. triceps brachii</i> (ulna)	2,6	2,25	1,431	0,173
<i>M. brachialis</i> (ulna)	2,1	1,97	1,152	0,257
<i>M. supinator</i> (ulna)	1,9	1,79	0,85	0,401
<i>M. gluteus maximus</i> (fémur)	2,2	2,14	0,274	0,786
<i>M. iliopsoas</i> (fémur)	2,00	2,3	-1,152	0,279
<i>M. gluteus médios</i> (fémur)	-	-	-	-
Fossa digital (fémur)	-	-	-	-
<i>M. vastus medialis</i> (fémur)	2,3	2,53	-9,12	0,367
L. rotuliano e quadrilátero (patela)	1,8	1,33	2,159	0,054
Tendão quadrilátero (tíbia)	2,6	2,89	-1,567	0,135
<i>M. soleus</i> (tíbia)	2,00	2,00	0,00	1,000
Tendão de Aquiles (calcâneo)	3,3	3,67	-1	0,423

Legenda: D=direito; E=esquerdo; \bar{x} = média; *t* = teste; α =significância = <0,05 assinalada a negrito.

Tabela A. 21. Avaliação das lesões osteofíticas por lateralidade, na amostra SLCR.

Local/inserção	D	E		
Osteofítico vs lateralidade	\bar{x}	\bar{x}	<i>t</i>	α
L. costoclavicular (clavícula)	0	0	-	-
L. conoide (clavícula)	0,1	0	1	0,329
L. trapezoide (clavícula)	0	0	-	-
<i>M. pectoralis major</i> (clavícula)	0	0	1	0,325
<i>M. deltoideus</i> (clavícula)	0	0,06	-1	0,325
<i>M. pectoralis major</i> (úmero)	0	0,03	-1	0,326
<i>M. latissimus dorsii/teres</i> (úmero)	0	0	-	-
<i>M. deltoideus</i> (úmero)	0	0	-	-
<i>M. brachioradialis</i> (úmero)	0	0	-	-
Epicôndilo medial (úmero)	0,1	0	1	0,332
Epicôndilo lateral (úmero)	0,3	0	1,749	0,104
<i>M. triceps brachii</i> (escápula)	0	0	-	-
<i>M. deltoideus</i> (escápula)	0	0	-	-
<i>M. biceps coraco brachial</i> (escápula)	0	0	-	-
<i>M. triceps brachii</i> (rádio)	0,4	0,36	0,254	0,802

Legenda: D=direito; E=esquerdo; \bar{x} = média; *t* = teste; α =significância = <0,05 assinalada a negrito.

Tabela A. 22. Continuação da avaliação das lesões osteofíticas por lateralidade, na amostra SLCR.

Local/inserção	D E		t	α
	\bar{x}	\bar{x}		
Osteofítico vs lateralidade				
M. <i>pronator teres</i> (rádio)	0,03	0,03	-	-
<i>Interosseous membrane</i> (rádio)	0,00	0,00	-	-
M. <i>triceps brachii</i> (ulna)	0,19	0,06	1,00	0,333
M. <i>brachialis</i> (ulna)	0,08	0,05	0,442	0,661
M. <i>supinator</i> (ulna)	0,13	0,03	0,941	0,353
M. <i>gluteus maximus</i> (fémur)	0,90	0,60	1,00	0,324
M. <i>iliopsoas</i> (fémur)	0,10	0,40	-1,964	0,081
M. <i>gluteus médios</i> (fémur)	0,25	0,00	1,00	0,351
Fossa digital (fémur)	0,56	0,78	-1,458	0,163
M. <i>vastus medialis</i> (fémur)	1,13	1,44	-1,00	0,323
L. rotuliano e quadrilátero (patela)	0,33	0,25	1,00	0,339
Tendão quadrilátero (tíbia)	0,41	0,65	-1,074	0,299
M. <i>soleus</i> (tíbia)	0,14	0,04	1,362	0,184
Tendão de Aquiles (calcâneo)	0,50	0,50	-	-

Legenda: D=direito; E=esquerdo; \bar{x} = média; t = teste; α =significância = <0,05 assinalada a negrito.

Tabela A. 23. Avaliação das lesões osteolíticas por lateralidade, na amostra LCR.

Local/inserção	D E		t	α
	\bar{x}	\bar{x}		
Osteolítico vs lateralidade				
L. costoclavicular (clavícula)	1,14	0,69	1,338	0,192
L. conoide (clavícula)	0,00	0,09	-1,449	0,162
L. trapezoide (clavícula)	0,17	0,13	1,000	0,326
M. <i>pectoralis major</i> (clavícula)	0,00	0,03	-1,000	0,325
M. <i>deltoideus</i> (clavícula)	0,55	0,10	1,1506	0,143
M. <i>pectoralis major</i> (úmero)	0,30	0,40	-0,423	0,676
M. <i>latissimus dorsii/teres</i> (úmero)	0,26	0,00	1,438	0,161
M. <i>deltoideus</i> (úmero)	0,00	0,00	-	-
M. <i>brachioradialis</i> (úmero)	0,00	0,00	-	-
Epicôndilo medial (úmero)	0,00	0,00	-	-
Epicôndilo lateral (úmero)	0,00	0,00	-	-
M. <i>triceps brachii</i> (escápula)	0,82	0,18	2,609	0,026
M. <i>deltoideus</i> (escápula)	0,00	0,00	-	-
M. <i>biceps coraco brachial</i> (escápula)	0,00	1,00	-	-
M. <i>triceps brachii</i> (rádio)	0,57	0,46	0,721	0,477
M. <i>pronator teres</i> (rádio)	0,00	0,00	-	-
<i>Interosseous membrane</i> (rádio)	0,00	0,00	-	-
M. <i>triceps brachii</i> (ulna)	0,00	0,00	-	-
M. <i>brachialis</i> (ulna)	0,14	0,05	0,723	0,474
M. <i>supinator</i> (ulna)	0,03	0,05	-1,000	0,324

Legenda: D=direito; E=esquerdo; \bar{x} = média; t = teste; α =significância = <0,05 assinalada a negrito.

Tabela A. 24. Continuação da avaliação das lesões osteolíticas por lateralidade, na amostra SLCR.

Local/inserção	D		E	
	\bar{x}	\bar{x}	<i>t</i>	α
<i>M. gluteus maximus</i> (fêmur)	0,14	0,14	0,00	1,000
<i>M. iliopsoas</i> (fêmur)	0,10	0,3	-1,00	0,343
<i>M. gluteus</i> médios (fêmur)	0,13	0,25	-1,00	0,351
Fossa digital (fêmur)	0,00	0,00	-	-
<i>M. vastus medialis</i> (fêmur)	1,09	1,4	-1,00	0,323
L. rotuliano e quadrilátero (patela)	0,00	0,00	-	-
Tendão quadrilátero (tíbia)	0,00	0,00	-	-
<i>M. soleus</i> (tíbia)	0,32	0,29	0,328	0,745
Tendão de Aquiles (calcâneo)	0,00	0,00	-	-

Legenda: D=direito; E=esquerdo; \bar{x} = média; *t* = teste; α =significância = <0,05 assinalada a negrito.

Tabela A. 25. Dados sobre a alteração da entese no sexo masculino, na amostra SLCR.

Local/inserção	lado	Robustez					Lesões osteofíticas					Lesões osteolíticas							
		1a	1b	1c	2	3	n	0	1	2	3	n	%	0	1	2	3	n	%
L. costoclavicular (clavícula)	D	4	4	8	5	5	26	26	0	0	0	26	0	14	4	1	7	26	46
	E	9	5	4	5	2	25	25	0	0	0	25	0	16	2	3	4	25	36
L. conoide (clavícula)	D	3	8	9	2	0	22	20	1	0	0	21	5	19	2	0	0	21	10
	E	4	7	6	3	0	20	19	0	0	0	19	0	17	2	0	0	19	11
L. trapezoide (clavícula)	D	13	5	5	1	0	24	24	0	0	0	24	0	20	4	0	0	24	17
	E	14	6	0	2	0	22	22	0	0	0	22	0	19	3	0	0	22	14
<i>M. pectoralis major</i> (clavícula)	D	2	8	4	10	2	26	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0
	E	3	5	6	10	1	25	25	0	0	0	25	0	24	1	0	0	25	4
<i>M. deltoideus</i> (clavícula)	D	2	11	8	2	1	24	24	0	0	0	24	0	18	5	1	0	24	25
	E	4	8	9	2	1	24	24	0	0	0	24	0	20	3	1	0	24	17
<i>M. pectoralis major</i> (úmero)	D	4	11	9	0	1	25	24	1	0	0	25	4	22	1	0	2	25	12
	E	5	10	4	1	1	21	20	1	0	0	21	5	18	0	0	3	21	14
<i>M. latissimus dorsii/teres</i> (úmero)	D	18	3	4	1	0	26	26	0	0	0	26	0	23	0	0	3	26	12
	E	15	5	0	2	0	22	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0
<i>M. deltoideus</i> (úmero)	D	14	7	4	1	1	27	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0
	E	12	6	2	3	0	23	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0
<i>M. brachioradialis</i> (úmero)	D	6	5	6	1	4	22	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0
	E	8	3	4	4	1	20	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0
Epicôndilo medial (úmero)	D	-	-	-	-	-	-	16	2	0	0	18	11	18	0	0	0	18	0
	E	-	-	-	-	-	-	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0
Epicôndilo lateral (úmero)	D	-	-	-	-	-	-	13	2	1	0	16	19	16	0	0	0	16	0
	E	-	-	-	-	-	-	15	1	0	0	16	6	16	0	0	0	16	0

Legenda: L= ligamento; M=músculo; % = percentagem total das lesões osteolíticas e osteofíticas; n = número total observado no sexo masculino.

Tabela A. 26. Continuação dos dados sobre a alteração da entese no sexo masculino, na amostra SLCR.

Local/inserção	lado	Robustez						Lesões osteofíticas					Lesões osteolíticas						
		1a	1b	1c	2	3	n	0	1	2	3	n	%	0	1	2	3	n	%
<i>M. tríceps brachii</i> (escápula)	D	2	4	4	2	3	15	15	0	0	0	15	0	7	7	1	0	15	53
	E	2	4	2	2	1	11	11	0	0	0	11	0	9	2	0	0	11	18
<i>M. deltoideus</i> (escápula)	D	-	-	-	-	-	-	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
	E	-	-	-	-	-	-	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
<i>M. biceps coraco brachial</i> (escápula)	D	-	-	-	-	-	-	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
	E	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
<i>M. tríceps brachii</i> (rádio)	D	10	8	5	0	1	24	18	3	1	2	24	25	18	4	0	2	24	25
	E	7	8	4	0	2	21	16	5	0	1	22	27	15	4	2	1	22	32
<i>M. pronator teres</i> (rádio)	D	20	4	1	0	0	25	24	1	0	0	25	4	25	0	0	0	25	0
	E	18	6	1	0	0	25	24	1	0	0	25	4	25	0	0	0	25	0
<i>Interosseous membrane</i> (rádio)	D	5	6	11	3	0	25	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0
	E	8	6	8	3	0	25	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0
<i>M. tríceps brachii</i> (ulna)	D	4	9	1	4	2	20	18	1	1	0	20	10	20	0	0	0	20	0
	E	6	9	1	2	1	19	18	1	0	0	19	5	19	0	0	0	19	0
<i>M. brachialis</i> (ulna)	D	4	15	3	2	1	25	24	1	0	0	25	4	24	0	0	1	25	4
	E	6	15	3	2	0	26	24	2	0	0	26	8	25	1	0	0	26	4
<i>M. supinator</i> (ulna)	D	10	9	6	1	0	26	24	1	0	1	26	8	26	0	0	0	26	0
	E	8	15	2	1	0	26	25	1	0	0	25	4	26	0	0	0	26	0
<i>M. gluteus maximus</i> (fémur)	D	7	9	6	1	1	24	23	0	1	0	24	4	22	2	0	0	24	8
	E	9	7	4	2	1	23	22	0	1	0	23	4	21	2	0	0	23	9
<i>M. iliopsoas</i> (fémur)	D	5	2	2	0	2	11	9	1	1	0	11	18	10	1	0	0	11	9
	E	6	3	5	3	1	18	13	5	0	0	18	28	15	2	1	0	18	17
<i>M. gluteus médios</i> (fémur)	D	-	-	-	-	-	-	9	1	0	0	10	10	9	1	0	0	10	10
	E	-	-	-	-	-	-	9	0	0	0	9	0	8	0	1	0	9	11
Fossa digital (fémur)	D	-	-	-	-	-	-	11	4	3	0	18	39	18	0	0	0	18	0
	E	-	-	-	-	-	-	9	6	2	1	18	50	18	0	0	0	18	0
<i>M. vastus medialis</i> (fémur)	D	17	3	0	2	0	22	21	1	0	0	22	9	22	0	0	0	22	0
	E	17	4	0	1	0	22	21	1	0	0	22	9	22	0	0	0	22	0
L. rotuliano e quadrilátero (patela)	D	5	5	1	0	0	11	9	2	0	0	11	18	11	0	0	0	11	0
	E	10	2	0	0	0	12	11	1	0	0	12	8	12	0	0	0	12	0
Tendão quadrilátero (tíbia)	D	4	1	4	3	2	14	10	1	3	0	14	27	14	0	0	0	14	0
	E	4	2	4	4	1	15	11	2	0	2	15	27	15	0	0	0	15	0
<i>M. soleus</i> (tíbia)	D	10	5	1	2	1	19	18	1	0	0	19	5	17	0	2	0	19	11
	E	9	6	2	1	2	20	20	0	0	0	20	0	19	0	0	1	20	5
Tendão de Aquiles (calcâneo)	D	1	0	3	1	0	5	2	3	0	0	23	13	5	0	0	0	5	0
	E	0	1	1	3	0	5	2	1	0	0	3	33	4	0	0	0	4	0

Legenda: L= ligamento; M=músculo; % = percentagem total das lesões osteolíticas e osteofíticas; n = número total observado no sexo masculino.

Tabela A. 27. Dados sobre a alteração da entese no sexo feminino, na amostra SLCR.

Local/inserção	lado	Robustez						Lesões osteofíticas					Lesões osteolíticas						
		1a	1b	1c	2	3	n	0	1	2	3	n	%	0	1	2	3	n	%
L. costoclavicular (clavícula)	D	2	1	2	3	0	8	7	1	0	0	8	13	7	1	0	0	8	13
	E	1	3	2	0	0	6	6	0	0	0	6	0	5	1	0	0	6	17
L. conoide (clavícula)	D	1	1	3	4	0	9	8	0	0	0	8	0	6	2	0	0	8	25
	E	0	1	4	0	0	5	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
L. trapezoide (clavícula)	D	4	2	3	1	0	10	10	0	0	0	10	0	9	1	0	0	10	10
	E	4	3	1	0	0	8	8	0	0	0	8	0	7	1	0	0	8	13
M. pectoralis major (clavícula)	D	3	4	0	2	0	9	8	1	0	0	9	11	9	0	0	0	9	0
	E	3	4	1	0	0	8	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0
M. deltoideus (clavícula)	D	1	3	1	5	0	10	10	0	0	0	10	0	9	0	1	0	10	10
	E	2	2	2	2	0	8	7	1	0	0	8	13	8	0	0	0	8	0
M. pectoralis major (úmero)	D	3	7	2	0	0	12	12	0	0	0	12	0	11	1	0	0	12	8
	E	4	6	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0
M. latissimus dorsii/teres (úmero)	D	9	2	1	0	0	12	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
	E	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0
M. deltoideus (úmero)	D	6	1	5	0	0	12	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
	E	7	4	1	0	0	12	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
M. brachioradialis (úmero)	D	2	2	1	1	1	7	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0
	E	0	2	0	4	0	6	5	0	1	0	6	17	6	0	0	0	6	0
Epicôndilo medial (úmero)	D	-	-	-	-	-	-	3	0	0	1	4	25	4	0	0	0	4	0
	E	-	-	-	-	-	-	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
Epicôndilo lateral (úmero)	D	-	-	-	-	-	-	1	0	0	2	3	47	3	0	0	0	3	0
	E	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
M. tríceps brachii (escápula)	D	1	2	1	0	0	4	4	0	0	0	4	0	2	1	1	0	4	50
	E	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
M. deltoideus (escápula)	D	-	-	-	-	-	-	3	0	0	0	3	0	2	1	0	0	3	33
	E	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M. biceps coraco brachial (escápula)	D	-	-	-	-	-	-	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0
	E	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	100
M. tríceps brachii (rádio)	D	6	4	0	0	0	10	9	0	0	0	9	0	5	4	0	0	9	44
	E	5	1	2	0	0	8	7	1	0	0	8	13	6	1	1	0	8	25
M. pronator teres (rádio)	D	10	1	0	0	0	11	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0
	E	9	1	0	0	0	10	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0
Interosseous membrane (rádio)	D	2	3	6	1	0	12	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0
	E	2	6	3	2	0	13	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0
M. tríceps brachii (ulna)	D	1	2	1	0	0	4	4	1	0	0	5	20	5	0	0	0	5	0
	E	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
M. brachialis (ulna)	D	5	5	1	1	0	12	10	2	0	0	12	17	11	1	0	0	12	8
	E	6	5	0	1	0	12	12	0	0	0	12	0	11	1	0	0	12	8
M. supinator (ulna)	D	5	6	1	1	0	13	12	1	0	0	13	8	11	1	0	0	12	8
	E	6	6	0	1	0	13	12	0	0	0	12	0	11	0	1	0	12	8

Legenda: L= ligamento; M=músculo; % = percentagem total das lesões osteofíticas e osteolíticas; n = número total observado no feminino.

Tabela A. 28. Continuação dos dados sobre a alteração da entese no sexo feminino, na amostra SLCR.

Local/inserção	lado	Robustez						Lesões osteofíticas					Lesões osteolíticas						
		1a	1b	1c	2	3	n	0	1	2	3	n	%	0	1	2	3	n	%
<i>M. gluteus maximus</i> (fémur)	D	4	5	2	1	0	12	11	1	0	0	12	8	8	4	0	0	12	33
	E	3	5	2	1	0	11	11	0	0	0	11	0	8	3	0	0	11	27
<i>M. iliopsoas</i> (fémur)	D	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
	E	4	1	0	0	0	5	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0
<i>M. gluteus médios</i> (fémur)	D	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
	E	-	-	-	-	-	-	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0
Fossa digital (fémur)	D	-	-	-	-	-	-	2	1	1	0	4	50	4	0	0	0	4	0
	E	-	-	-	-	-	-	3	1	0	1	5	40	5	0	0	0	5	0
<i>M. vastus medialis</i> (fémur)	D	10	1	1	1	0	13	12	1	0	0	13	8	13	0	0	0	13	0
	E	7	4	1	0	0	12	11	1	0	0	12	8	12	0	0	0	12	0
L. rotuliano e quadrilátero (patela)	D	3	0	2	0	0	5	3	2	0	0	5	40	5	0	0	0	5	0
	E	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0
Tendão quadrilátero (tíbia)	D	3	2	2	1	0	8	6	1	1	0	8	25	8	0	0	0	8	0
	E	0	2	2	2	0	6	4	1	0	0	5	20	6	0	0	0	6	0
<i>M. soleus</i> (tíbia)	D	4	4	1	0	1	10	9	0	0	1	10	10	8	1	0	1	10	20
	E	5	3	1	1	0	10	9	1	0	0	10	10	9	0	0	1	10	10
Tendão de Aquiles (calcâneo)	D	0	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	50	2	0	0	0	2	0
	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Legenda: L= ligamento; M=músculo; % = percentagem total das lesões osteofíticas e osteolíticas; n = número total observado no feminino.

Tabela A. 29. Frequência de nódulos de Schmorl.

Vértebra	superfície	Fase 1	Fase 2	Total	
				n	%
cervicais	superior	4	0	4/146	3
	inferior	5	1	6/144	4
	total	9	1	10/286	3
torácicas	superior	15	4	19/236	8
	inferior	16	15	31/248	13
	total	31	19	50/484	10
lombares	superior	9	2	11/91	12
	inferior	8	6	14/98	14
	total	17	8	25/189	13
Totais	n	57	28	85/959	9
	%	6	3	9	-